

# SITUACIÓN DE SALUD DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA ARGENTINA

Agosto 2015

Programa Nacional de Salud Escolar

Programa Nacional  
de Salud Escolar



Ministerio de Salud  
Presidencia de la Nación

# SITUACIÓN DE SALUD DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Ministerio de Salud de la Nación  
Secretaría de Salud Comunitaria  
Dirección Nacional de Medicina Comunitaria  
Programa Nacional de Salud Escolar  
PROSANE

## Autoridades:

### Presidente

Ing. Mauricio MACRI

### Ministro de Salud

Dr. Jorge LEMUS

### Secretario de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria

Dr. Néstor PÉREZ BALIÑO

### Subsecretaria de Atención Primaria de la Salud

Dra. Dora VILAR DE SARÁCHAGA

### Directora Nacional de Atención Comunitaria

Dra. María Cristina ECHEGOYEN

### Programa Nacional de Salud Escolar (PROSANE)

Dr. Alfonso NOVOA

## Autores:

Dra. Verónica María Lucconi Grisolía

Dra. Débora Lev

Simón Dematteis

Índice:	Página
<b>1. Introducción</b>	1
<b>2. Políticas Integradas Salud-Educación para el Cuidado de niños, niñas y adolescentes</b>	2
<b>3. Información demográfica, socioeconómica y educativa</b>	4
<b>4. Causas de morbi-mortalidad en los niños, niñas y adolescentes</b>	17
<b>5. Análisis de los problemas de salud prevalentes de los niños, niñas y adolescentes de escuelas de nivel primario</b>	25
a. Población evaluada	25
b. Aspectos metodológicos	26
c. Características de la población	29
d. Problemas de salud más frecuentes	34
e. Problemas de salud específicos de los niños, niñas y adolescentes de escuelas de nivel primario:	38
I. Hallazgos clínicos	38
II. Hallazgos antropométricos	42
III. Hallazgos oftalmológicos	47
IV. Hallazgos fonaudiológicos	50
V. Hallazgos odontológicos	54
<b>6. Conclusiones</b>	58
<b>7. Lista de gráficos y tablas</b>	61
<b>8. Anexos</b>	66

## 1. Introducción

El siguiente documento presenta una descripción de la situación de salud de niños, niñas y adolescentes de 5 a 13 años de edad de nuestro país.

Representa el trabajo y compromiso sostenido de cada una de las jurisdicciones que han asumido el desafío de garantizar el acceso al derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes.

En la primera parte se presentan los fundamentos de PROSANE como una Política Integrada Salud-Educación para el cuidado de niñas, niños y adolescentes, jerarquizando el rol del Estado como articulador y regulador de políticas públicas en Salud.

En segundo lugar se expone el análisis de los problemas de salud prevalentes de niñas, niños y adolescentes de escuelas de nivel primario, correspondiente al año 2013.

Los niños/as en edad escolar presentan una mortalidad baja en relación con otros grupos de edad. Lo mismo ocurre con el padecimiento de eventos que requieren internación, abonando la idea que este grupo etario no presenta problemas de salud. Sin embargo, como veremos más adelante, los eventos de salud que se presentan con mayor frecuencia, sí tendrán un gran impacto en su salud y en el desarrollo integral en el mediano a largo plazo.

Con la certeza de que es posible desarrollar desde las edades más tempranas una cultura de la salud, concibiéndola como un concepto positivo que va más allá de la idea de un organismo sin enfermedad, es necesario fortalecer políticas públicas donde Salud y Educación integren la mirada y se reconozcan como socios estratégicos para mejorar la calidad de vida de los cerca de diez millones de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a los tres niveles educativos.

Esperamos que este documento sea una herramienta útil para generar estrategias de intervención acordes con la realidad local, y para la toma de decisiones en cada una de las jurisdicciones, fortaleciendo así el cuidado de la salud de las niñas, los niños y adolescentes.

## 2. Políticas Integradas de cuidado Salud-Educación para los niños, niñas y adolescentes

Desde el año 2003, y desde una clara perspectiva de derechos humanos, el Estado Nacional se hace presente desarrollando políticas públicas tendientes a reparar las desigualdades sociales; realizando un trabajo permanente de inclusión, creando oportunidades para el acceso universal e igualitario a la educación, la salud, la vivienda, promoviendo el progreso social en el esfuerzo y el trabajo de todos y cada uno de los argentinos.

Si bien se han logrado avances significativos en este aspecto todavía existen sectores de la población que en los hechos no puede aún ejercer uno de sus derechos básicos: el **derecho a la salud**.

Por diversas razones muchos niños, niñas y adolescentes aún no acceden a un control integral de salud, no han completado el Calendario Nacional de Vacunación, no fueron equipados oportunamente con anteojos, etc. Estas realidades provocan un impacto negativo en el potencial desarrollo y aprendizaje, aumentando la inasistencia a la escuela, demorando la adquisición de conocimientos y generando inequidades al momento de enfrentarse con los desafíos escolares.

La cotidianidad es el escenario clave para promover acciones de educación para la salud en una forma efectiva, es por esto que mediante intervenciones coordinadas entre el sector educativo y el de salud, es posible mejorar las condiciones de salud de las niñas, niños y adolescentes y fundamentalmente, incidir en su formación integral enfatizando el desarrollo de competencias que les permitan conocer y modificar los determinantes de la salud.

Implementar una Política Nacional de Salud para la Niñez en consonancia con la universalidad que tiene la educación en todas las franjas de la población, permite recuperar, en definitiva, el rol que el Estado no debería haber resignado jamás.

---

El **PROSANE, Programa Nacional de Salud Escolar**, tiene como objetivo general propiciar y fortalecer Políticas Integradas de Cuidado Salud-Educación, dentro del marco de la **Ley Nº 26.061: “Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”**, que permitan dar respuesta activa a las necesidades de atención de los niños, las niñas y adolescentes en edad escolar, **dando impulso a acciones de prevención de enfermedades y promoción de la salud, fortaleciendo la articulación entre los Ministerios de Salud y Educación Provinciales.**

---

Son **objetivos específicos** del Programa Nacional de Salud Escolar:

- Enmarcar al Programa Nacional de Salud Escolar dentro de la estrategia de Atención Primaria de la Salud.
- Identificar el estado de salud de los niños, niñas y adolescentes de las cohortes seleccionadas mediante un Control Integral de Salud.
- Propiciar la accesibilidad de la población objetivo al Primer Nivel de Atención y la articulación con el Segundo y Tercer Nivel de Atención.
- Coordinar acciones conjuntas entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, a nivel Nacional, Provincial y Local, para fortalecer la Salud Integral de los niños, niñas y adolescentes.
- Propiciar la conformación y fortalecimiento de las mesas intersectoriales de gestión local, destinadas a impulsar “Políticas de Cuidado para los niños, niñas y adolescentes.”
- Impulsar y desarrollar acciones de promoción de la salud con la comunidad educativa para propiciar el aprendizaje y desarrollo humano integral, el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar colectivo de niños, niñas y adolescentes y demás miembros de la comunidad.

### Implementación del PROSANE

El Programa Nacional de Salud Escolar (PROSANE) se enmarca en la estrategia de Atención Primaria de la Salud, por lo cual los equipos del primer nivel de atención trabajan con las escuelas pertenecientes a su área programática, con el fin de fortalecer la referencia y contrarreferencia.

Cada jurisdicción mediante la planificación anual organiza la estrategia que garantice la mejor cobertura de la población objetivo, realizando el **Control Integral de Salud “C.I.S”** en las escuelas o en los efectores de salud así como las actividades de promoción de la salud.

Toda la información se vuelca en la **“Planilla de Control Integral de Salud”** y posteriormente estos datos se cargan en **SISA “Sistema Integrado de Información Sanitaria”**, permitiendo la integración de la información sanitaria con otros Programas de salud (Nomivac; Remediar, Sumar, Renaper, etc.)

PROSANE resulta una estrategia fundamental para referenciar a la población de escolares al primer, segundo o tercer nivel para el seguimiento y resolución de las problemáticas detectadas.

Entendiendo a la escuela como el espacio social de aprendizaje, ejercicio de los derechos y construcción de ciudadanía, es que resulta imprescindible una alianza permanente entre los sectores de salud y educación para lograr iniciativas de promoción de la salud de amplio reconocimiento político y estratégico a nivel nacional.


### 3. Información demográfica, socioeconómica y educativa

#### Aspectos demográficos y socioeconómicos de la población Argentina

La Organización mundial de la salud define a los determinantes sociales de la salud como las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Con el objetivo de conocer las condiciones de vida de los niños/as en Argentina, se presenta una pequeña reseña con las características demográficas y socioeconómicas de la población Argentina.

Según los datos del Censo realizado en el año 2010, la Argentina posee 40.117.096 de habitantes distribuidos en 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La distribución de la población es heterogénea. La Provincia de Buenos Aires es la que presenta la mayor cantidad de habitantes, seguida de las Provincias de Córdoba, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Mapa 1).

Mapa 1. República Argentina por provincia. Población total. Año 2010



Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

A nivel poblacional, la Argentina se caracteriza por poseer una población joven con un predominio de los niños y los jóvenes y que se estrecha a medida que aumenta la edad (Gráfico 1). El índice de envejecimiento<sup>1</sup> es de 40,2, es decir que hay aproximadamente 40 adultos mayores de 65 años por cada 100 niños menores de 15 años. A medida que aumenta la edad, también aumenta la proporción de mujeres, sin embargo en la población de niños/as y adolescentes la proporción entre varones y mujeres es similar. La mediana de edad<sup>2</sup> de la población es de 29,8 años, es decir que el 50% de los habitantes de Argentina tiene menos de 29,8 años (Tabla 1).

A continuación se analizarán indicadores demográficos y socioeconómicos seleccionados para caracterizar a la población del país y su distribución a nivel provincial. Los indicadores demográficos seleccionados fueron: la distribución porcentual de los niños/as y adolescentes de 6 a 11 años, el índice de envejecimiento y la mediana de edad. Los indicadores socioeconómicos seleccionados fueron: la proporción de la población mayor de 10 años analfabeta, la población con cobertura únicamente estatal, tanto para la población general como para la población de niños/as en edad escolar, y los hogares con al menos un indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas<sup>3</sup> (NBI).

Gráfico 1. Pirámide de población: estructura por edad y sexo. Total del país.

1 El índice de envejecimiento es un indicador de cambios en la estructura de edades de la población. Se define como la cantidad de personas de 65 y más años por cada cien personas menores de 15 años (INDEC).

2 Edad mediana de la población: se trata de una medida estadística de posición, que se expresa como la edad que divide la población en dos grupos de igual número de personas (INDEC).

3 A partir de la definición del INDEC, los Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas son aquellos que presentan al menos una de las siguientes condiciones de privación:

NBI 1. Vivienda: es el tipo de vivienda que habitan los hogares que moran en habitaciones de inquilinato, hotel o pensión, viviendas no destinadas a fines habitacionales, viviendas precarias y otro tipo de vivienda. Se excluye a las viviendas tipo casa, departamento y rancho.


NBI 2. Condiciones sanitarias: incluye a los hogares que no poseen retrete.

NBI 3. Hacinamiento: es la relación entre la cantidad total de miembros del hogar y la cantidad de habitaciones de uso exclusivo del hogar. Operacionalmente se considera que existe hacinamiento crítico cuando en el hogar hay más de tres personas por cuarto.

NBI 4. Asistencia escolar: hogares que tienen al menos un niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asiste a la escuela.

NBI 5. Capacidad de subsistencia: incluye a los hogares que tienen cuatro o más personas por miembro ocupado y que tienen un jefe no ha completado el tercer grado de escolaridad primaria.

Año 2010



Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

En Argentina viven más de 4 millones de niños/as y adolescentes de 6 a 11 años y representan el 10,2% de la población (Tabla 1). Como veremos más adelante, esta distribución porcentual es heterogénea en las provincias y está relacionado con el envejecimiento poblacional.

La alfabetización es un derecho humano fundamental y constituye la base del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Por su capacidad de transformar la vida de las personas, la alfabetización resulta esencial para el desarrollo humano y social. Tanto para las personas y las familias como para las sociedades, es un instrumento que confiere autonomía con miras a mejorar la salud, el ingreso y la relación con el mundo<sup>4</sup>. Según los indicadores socioeconómicos, de cada 100 habitantes mayores de 10 años casi 2 son analfabetos (Tabla 1).

La población con cobertura de salud es aquella que se encuentra cubierta ya sea por una obra social, una prepaga por derivación de aportes o por contratación voluntaria. Se consideraron personas con cobertura únicamente estatal a quienes se encuentran bajo programas o planes estatales de salud<sup>5</sup> y a quienes no tienen obra social o prepaga. En Argentina, de cada 100 habitantes, 38 poseen cobertura de salud únicamente estatal. Si se analiza únicamente a la población de niños/as 5 a 14 años, este porcentaje es aún mayor llegando a 46 de cada 100 niños/as con cobertura únicamente estatal (Tabla 1).

Las características habitacionales son un importante determinante de salud y es un reflejo de las condiciones de vida de la población. El indicador de NBI es un indicador compuesto que incluye, además de los factores referidos a las condiciones de la vivienda; indicadores de salud, educación y empleo. En el último censo de los 12.171.675 hogares censados en Argentina, el 9,1% presenta al menos un indicador de NBI (Tabla 1).

Tabla 1. Indicadores demográficos y socioeconómicos. República Argentina. Año 2010

<b>Población total</b>	<b>40.117.096</b>
N° Niños/as de 6 a 11 años	4.104.008
% Niños/as de 6 a 11 años	10,2
Índice de envejecimiento	40,2
Edad Mediana	29,8
% Población mayor de 10 años analfabeta	1,9
% población general con cobertura únicamente estatal	37,9
% Niños/as 5 a 14 años con cobertura únicamente estatal	45,7
% Hogares con al menos un indicador de NBI	9,1

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010


4 UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Disponible en: <http://www.unesco.org/new/es/education/themes/education-building-blocks/literacy/>

5 Según el INDEC los programas o planes estatales de salud son los programas o planes de salud estatales nacionales -como el PROFE o el plan NACER-, provinciales, municipales entre otros, que otorgan derecho a atención médica mediante la inscripción en un padrón.

## Indicadores demográficos, socioeconómicos y educativos a nivel provincial

La Ciudad de Buenos Aires presenta la menor proporción de niños/as de 6 a 11 años y la provincia de Misiones es la que presenta la mayor proporción. La población con mayor índice de envejecimiento es la de la Ciudad de Buenos Aires que presenta una relación de 1 a 1 entre los mayores de 65 años y los menores de 15 años. En contrapartida, Tierra del Fuego es la población más joven con solo 14 personas mayores de 65 años por cada 100 menores de 15 años (Gráfico 2). La mediana de edad más alta es la de la Ciudad de Buenos Aires con 36,8 años, acorde a su población más envejecida; y la mediana de edad más baja es la de la provincia de Misiones con 23,9 años.


Gráfico 2. Índice de envejecimiento. Provincias de Argentina. Año 2010



Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010

A nivel provincial, la Ciudad de Buenos Aires presenta la menor proporción de población mayor de 10 años analfabeta. Por el contrario, la provincia de Chaco presenta la proporción más alta. La brecha fue de 11 con un rango de 5% (Gráfico 3).


Gráfico 3. Distribución porcentual de la población mayor de 10 años analfabeta. Provincias de Argentina. Año 2010.



Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010

La provincia de Santa Cruz presenta la menor proporción de niños/as con cobertura únicamente estatal. Por el contrario, los niños/as de Formosa presentaron la proporción más alta. La brecha fue de 3.9 y el rango es de 51.5% (Gráfico 4).


Gráfico 4. Distribución porcentual de la población de 5 a 14 años con cobertura únicamente estatal según provincias de Argentina. Año 2010



Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010

La proporción de hogares con al menos un indicador de NBI más baja fue la de la provincia de La Pampa, mientras que la proporción más alta se presentó en la provincia de Formosa. La brecha fue de 5.2 y el rango de 15.9% (Gráfico 5).

Gráfico 5. Distribución porcentual de los hogares con al menos un indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) según provincias de Argentina. Año 2010



Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010

## A modo de resumen

Los datos globales de Argentina a nivel país promedian realidades diferentes a nivel provincial. Con el objetivo de resumir los indicadores a nivel provincial y evidenciar las diferencias jurisdiccionales, se realizó una estratificación de los indicadores organizando su distribución en cuartiles<sup>6</sup>. Para facilitar el análisis se atribuyó un color diferencial a cada cuartil, tal como se describe a continuación:

Cuartil Inferior	Cuartil Medio Inferior	Cuartil Medio Superior	Cuartil Superior
------------------	------------------------	------------------------	------------------

De esta manera, cada provincia presenta los datos de los 6 indicadores seleccionados con el color que corresponde al cuartil al cual pertenecen (Tabla 2).

A nivel demográfico se observa que las provincias de la Región Centro presentan las poblaciones más envejecidas. Estas provincias se encuentran en el cuartil superior en cuanto al índice de envejecimiento y la edad mediana; y se encuentran en el cuartil inferior en la proporción de niños en edad primaria. Lo contrario ocurre con algunas provincias del noreste y noroeste argentino, tales como Misiones, Santiago del Estero, Formosa y Chaco que poseen poblaciones más jóvenes con un índice de envejecimiento y edad mediana correspondientes al cuartil inferior y con una proporción de niños en edad primaria superior (Tabla 2).

A nivel socioeconómico también se observan distribuciones heterogéneas. Todas las provincias del noreste, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, se ubicaron en el cuartil superior en cuanto a la proporción de población analfabeta. Por el contrario, la mayor parte de las provincias de la región Centro, al igual que San Luis, La Rioja, Santa Cruz y Tierra del Fuego, presentaron la menor proporción de población analfabeta (Tabla 2).

En cuanto a la cobertura de salud, la mayor parte de las provincias presentaron una mayor proporción de niños/as de 5 a 14 años con cobertura únicamente estatal en relación a la población general. Tierra del Fuego y Santa Cruz presentaron una proporción de cobertura únicamente estatal mayor en la población general que en la de los niños/as de 5 a 14 años; y la provincia de Chubut no presentó diferencias. La proporción de niños/as con cobertura únicamente estatal fue más alta en las provincias del NOA y NEA, ubicándose en los cuartiles superiores. Aproximadamente 7 de cada 10 niños/as de las provincias de Chaco y Formosa poseen cobertura de salud únicamente estatal. Por el contrario, las provincias de la región Patagonia y la Ciudad de Buenos Aires, presentaron la menor proporción de niños/as con cobertura únicamente estatal (Tabla 2).

Las provincias de NOA y del NEA se ubicaron en los cuartiles superiores en cuanto a los hogares con al menos un indicador de NBI. En las provincias de Formosa y Salta 2 de cada 10 hogares presentaron al menos un indicador de NBI. La provincia de La Pampa presentó la menor proporción de hogares con NBI (Tabla 2).

En resumen, los indicadores evidencian que gran parte de las provincias de las regiones NOA y NEA se caracterizan por poseer poblaciones jóvenes, con mayor proporción de niños/as en edad escolar, mayor proporción de analfabetismo, población con cobertura únicamente estatal y hogares con indicadores de NBI. Por el contrario, algunas provincias de la región Centro y Patagonia presentan indicadores socioeconómicos más favorables.

**Tabla 2. Indicadores demográficos y socioeconómicos seleccionados. Provincias y Regiones. República Argentina. Año 2010.**

Referencias de los indicadores seleccionados:

Indicador 1	Población total
Indicador 2	% niños de 6 a 11 años
Indicador 3	Índice de envejecimiento
Indicador 4	Edad Mediana
Indicador 5	% población mayor de 10 años analfabeta
Indicador 6	% población general con cobertura únicamente estatal
Indicador 7	% niños/as 5 a 14 años con cobertura únicamente estatal
Indicador 8	% Hogares con al menos un indicador de NBI

Regiones	Provincia	Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3	Indicador 4	Indicador 5	Indicador 6	Indicador 7	Indicador 8
<b>Argentina</b>		<b>40.117.096</b>	<b>10,2</b>	<b>40,2</b>	<b>29,8</b>	<b>1,9</b>	<b>37,9</b>	<b>45,7</b>	<b>9,1</b>
Centro	Ciudad de Buenos Aires	2.890.151	6,4	100,3	36,8	0,5	19,1	25,5	6,0
	Buenos Aires	15.625.084	9,9	43,1	30,5	1,4	36,6	43,4	8,1
	Córdoba	3.308.876	9,8	45,9	30,5	1,5	34,6	42,4	6,0
	Entre Ríos	1.235.994	10,8	39,1	29,5	2,1	37,2	45,0	8,0
	Santa Fe	3.194.537	9,5	50,4	31,0	1,8	33,3	44,2	6,4
Cuyo	La Rioja	333.642	11,2	25,7	26,6	1,8	40,1	44,0	12,2
	Mendoza	1.738.929	9,8	40,0	29,3	2,2	38,3	44,3	7,6
	San Juan	681.055	11,5	30,3	27,6	2,1	46,4	52,1	10,2
	San Luis	432.310	11,4	31,3	28,5	1,8	41,9	49,1	7,9
Noroeste	Catamarca	367.828	12,2	27,0	26,8	2,0	41,0	45,1	11,3
	Jujuy	673.307	11,8	24,8	26,4	3,1	48,0	50,0	15,5
	Santiago del Estero	874.006	13,1	24,3	25,0	4	58,4	65,6	17,6
	Salta	1.214.441	12,7	22,4	24,9	3,1	50,2	55,0	19,4
	Tucumán	1.448.188	11,6	28,5	27,3	2,5	39,1	44,8	13,3
Noreste	Chaco	1.055.259	12,5	22,9	25,2	5,5	60,3	69,3	18,2
	Corrientes	992.595	12,2	26,8	26,0	4,3	52,1	59,3	15,1
	Formosa	530.162	13,0	22,2	24,6	4,1	60,3	69,4	19,7
	Misiones	1.101.593	13,3	19,4	23,9	4,1	48,3	54,1	15,6
Patagonia	Chubut	509.108	10,5	27,9	28,6	2,0	29,1	29,1	8,4
	La Pampa	318.951	10,0	45,2	31,0	1,9	36,2	42,9	3,8
	Neuquén	551.266	10,2	24,7	28,4	2,3	36,5	37,3	10,4
	Rio Negro	638.645	10,3	32,8	29,3	2,5	36,0	37,5	9,4
	Santa Cruz	273.964	11,0	18,9	27,4	1,1	21,6	17,9	8,2
	Tierra del Fuego	127.205	10,9	13,9	28,0	0,7	26,9	26,2	14,2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

<sup>6</sup> Los cuartiles son medidas de posición que dividen en cuatro partes porcentuales iguales a una distribución ordenada de datos. Cada parte tiene la misma cantidad de datos y representa un 25% de la totalidad de datos. Se organiza en cuatro estratos: cuartil superior (contiene al 25% de los datos más altos); cuartil medio superior, cuartil medio inferior y cuartil inferior (que contiene al 25% de los datos más bajos).

## Características del Sistema Educativo e indicadores seleccionados de la población Argentina

El sistema educativo argentino es el conjunto organizado de servicios y acciones educativas reguladas por el Estado, que posibilitan el ejercicio del derecho a la educación. Este Sistema está integrado por los servicios de educación de gestión estatal y privada, gestión cooperativa y gestión social, de todas las jurisdicciones del país, que abarcan los distintos niveles, ciclos y modalidades de la educación, definidos en la Ley Nº 26.206 (Ley de Educación Nacional).

Los cuatro niveles son: la educación Inicial, la educación Primaria, la educación Secundaria y la educación Superior. La educación Inicial comprende a los/as niños/as desde los cuarenta y cinco (45) días hasta los cinco (5) años de edad inclusive. La educación Primaria comienza a partir de los 6 años de edad y consta de 6 o de 7 años según la decisión de cada jurisdicción. Se puede optar por una estructura que contemple 7 años de primario y 5 de secundario o bien de 6 años de primario y 6 de secundario. La educación Secundaria consta de 6 o 5 años según cada jurisdicción lo determine y se divide en un ciclo básico y un ciclo orientado de carácter diversificado según las distintas áreas del conocimiento, del mundo social y del trabajo. La educación Superior comprende a las Universidades e Institutos Universitarios y los Institutos de Educación Superior.

Las ocho modalidades son las opciones organizativas y/o curriculares de la educación común, dentro de uno o más niveles educativos, que procuran dar respuesta a requerimientos específicos de formación.

Las modalidades son:

- Educación Técnico Profesional
- Educación Artística
- Educación Especial
- Educación Permanente de Jóvenes y Adultos
- Educación Rural<sup>7</sup>
- Educación Intercultural Bilingüe<sup>8</sup>
- Educación en Contextos de Privación de Libertad
- Educación Domiciliaria y Hospitalaria

Según datos del Ministerio de Educación correspondientes al año 2013, el sistema educativo argentino cuenta con un total de 12.181.972 alumnos en establecimientos educativos de los niveles inicial, primario, secundario y/o superior no universitario. El total de alumnos del nivel primario común (1° a 6° grado) asciende a 4.563.491 alumnos.

Argentina posee una alta tasa neta de escolarización primaria<sup>9</sup> ya que el 99% de los niños de 6 a 11 años asiste a un establecimiento educativo. Del total de niños escolarizados la mayoría asiste a una escuela primaria de educación común y menos del 1% asiste a una escuela primaria de educación especial (Tabla 3).

Según los últimos datos del Ministerio de Educación del año 2013, en Argentina existen un total de 23.637 escuelas primarias. La mayor parte de los establecimientos primarios son del sector público y poco menos de la mitad de las escuelas primarias se encuentra en el ámbito rural (Tabla 3).

Tabla 3. Indicadores educativos seleccionados. República Argentina

<b>N° niños de 6 a 11 años</b>	<b>4.104.008</b>
% niños 6 a 11 años que asiste a un establecimiento educativo	99,0
% niños 6 a 11 años que asisten al nivel primario de educación común	92,9
% niños de 6 a 11 años que asiste a una escuela especial	0,7
<b>N° Unidades educativas de nivel primario</b>	<b>23.637</b>
N° Unidades de educación común de nivel primario	22.227
N° unidades educativas de modalidad intercultural bilingüe de nivel primario	509
% unidades de educación común de nivel primario	94,0
% unidades de educación especial de nivel primario	6,0
% unidades de educación común de gestión estatal de nivel primario	83,1
% unidades de educación común de modalidad rural de nivel primario	46,2

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 y Relevamiento Anual 2013. DiNIECE. Ministerio de Educación.

El análisis de la población de niños de 6 a 11 años por provincia muestra que la tasa de escolarización, es decir la proporción de niños/as que asiste a un establecimiento educativo, es elevada en todas las provincias y oscila entre un 98,1% en Misiones y un 99,6% en Tierra del Fuego, que presenta la tasa de escolarización más alta.


<sup>7</sup>La Educación Rural es la modalidad del sistema educativo de los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria destinada a garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a través de formas adecuadas a las necesidades y particularidades de la población que habita en zonas rurales. Se implementa en las escuelas que son definidas como rurales según criterios consensuados entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las Provincias, en el marco del Consejo Federal de Educación.

<sup>8</sup>La Educación Intercultural Bilingüe es la modalidad del sistema educativo de los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria que garantiza el derecho constitucional de los pueblos originarios.

<sup>9</sup> La tasa neta de escolarización es el cociente entre el número de personas escolarizadas en cada nivel con edad escolar pertinente y el total de la población de ese grupo de edad

La oferta educativa varía en las distintas provincias. La provincia de Buenos Aires y Córdoba son las que presentan un mayor número de unidades educativas de nivel primario, relacionado con la mayor población que poseen. En cuanto a las unidades educativas por tipo de educación (común o especial), la provincia de Santa Cruz es la que presenta la mayor proporción de unidades de educación especial de nivel primario mientras que la provincia de Santiago del Estero es la que presenta la menor proporción (Gráfico 6).


Gráfico 6. Distribución porcentual de las unidades de educación común según tipo de educación. Provincias de Argentina. Año 2013.



Fuente: Elaboración propia a partir del Relevamiento Anual 2013. DiNIECE. Ministerio de Educación.

En cuanto al sector educativo, la mayor parte son escuelas de gestión estatal en todas las provincias. En el país, 8 de cada 10 unidades educativas son de gestión estatal. Sin embargo, existen proporciones heterogéneas a nivel provincial. Chaco y Formosa presentan la proporción más alta de de escuelas de gestión estatal. Por el contrario, en la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y en Tierra del Fuego la proporción es menor con un aumento del número de escuelas de gestión privada (Gráfico 7).


Gráfico 7. Distribución porcentual de las unidades de educación común según sector de gestión. Provincias de Argentina. Año 2013.



Fuente: Elaboración propia a partir del Relevamiento Anual 2013. DiNIECE. Ministerio de Educación.

Se consideran unidades educativas del ámbito rural a aquellas ubicadas en localidades con menos de 2.000 habitantes. A nivel país, poco menos de la mitad de las unidades educativas primarias se encuentra en el ámbito rural. A nivel provincial la distribución es muy variable. Santiago del Estero y Catamarca son las provincias con la mayor proporción de escuelas rurales (Gráfico 8).

**Gráfico 8. Distribución porcentual de las unidades de educación común según ámbito. Provincias de Argentina. Año 2013.**




Fuente: Elaboración propia a partir del Relevamiento Anual 2013. DiNIECE. Ministerio de Educación.

Se define como unidad educativa de modalidad intercultural bilingüe a aquella que en su matrícula tenga alumnos pertenecientes o reconocidos de las comunidades indígenas y que en su proyecto institucional participen las comunidades indígenas para la elaboración de contenidos curriculares referidos a sus vivencias y culturas o la demanda de necesidades educativas con el objeto de resguardar la cultura indígena y su lengua.

Según los datos del Ministerio de educación del año 2012, en Argentina hay 743 unidades educativas interculturales bilingües de nivel primario. Estas unidades educativas se distribuyen principalmente en las provincias de la región noreste y noroeste del país. Salta, Formosa, Chaco y Jujuy son las que presentan el mayor número de unidades educativas bilingües (Gráfico 9).

**Gráfico 9. N° de unidades educativas de modalidad intercultural bilingüe de nivel primario. Provincias de Argentina. Año 2012**



Fuente: Elaboración propia a partir del relevamiento Anual 2012. DiNIECE. Ministerio de Educación.


#### 4. Causas de morbi-mortalidad en los niños, niñas y adolescentes en edad escolar

En este capítulo desarrollaremos las principales causas de muerte y las principales causas de internación en los niños/as en edad escolar y en el próximo capítulo desarrollaremos los problemas de salud prevalentes en la población escolarizada evaluada por el PROSANE.

Los niños/as en edad escolar presentan una mortalidad baja en relación con otros grupos de edad. Lo mismo ocurre con el padecimiento de eventos que requieren internación. Esta baja frecuencia de internaciones y defunciones de los niños/as en comparación con otros grupos de edad, genera la sensación de que los niños/as en edad escolar no presentan problemas de salud. Como veremos más adelante, los eventos de salud que presentan de los niños/as de esta edad con mayor frecuencia no son problemas de salud que requerirán internaciones o le causarán la muerte, pero sí tendrán un efecto en su salud en el mediano a largo plazo. Problemas tales como el sobrepeso y la obesidad, los problemas odontológicos o los problemas oftalmológicos tendrán una consecuencia negativa en el transcurrir de la vida de estos niños/as, futuros jóvenes y adultos.

Por lo tanto, los problemas de salud más frecuentes en los niños/as en edad escolar son los que representan menor gravedad y a medida que la gravedad de los eventos aumenta, su frecuencia disminuye, tal como se observa en la figura.

**Gráfico 10. Eventos de salud en los niños/as y adolescentes según frecuencia y gravedad.**



Fuente: Elaboración propia

#### Principales causas de mortalidad

En el año 2013 murieron en Argentina 326.197 personas, de las cuales 1.604 fueron niños/as y adolescentes de 5 a 14 años (Tabla 4).


**Tabla 4. Indicadores de mortalidad en la población de 5 a 14 años. Argentina. Año 2013**

Indicadores	5 a 9	10 a 14	5 a 14
N° total de niños/as de Argentina (proyección 2013)	3.522.721	3.515.301	7.038.022
N° defunciones	702	902	1.604
Tasa de mortalidad (por mil habitantes)	0,2	0,3	0,2
Mortalidad Proporcional (%)	0,2	0,3	0,5

Fuente: INDEC y DEIS

Tal como se observa en el gráfico, la tasas de mortalidad por grupos de edad presentan una curva característica en la cual luego de los menores de 1 año, las tasas presentan una importante caída, llegando a su punto más bajo en los niños/as de 5 a 9 años. Luego, las tasas comienzan a ascender a medida que aumenta la edad. Las tasas de mortalidad más bajas corresponden a los niños/as de 5 a 9 años y adolescentes de 10 a 14 años. A partir de los 15 años la tasa de mortalidad comienza a sufrir un aumento. Por lo tanto, los niños/as en edad escolar son los que presentan el menor riesgo de mortalidad comparado con el resto de los grupos etarios (Gráfico 11).

**Gráfico 11. Tasa de Mortalidad (por mil habitantes) según grupos de edad. Argentina. Año 2013**




Fuente: DEIS

La mortalidad proporcional establece el peso de las muertes ocurridas en cada grupo de edad y sexo respecto del total de muertes. En el gráfico se observa que la mortalidad proporcional en varones y mujeres presenta un comportamiento diferente luego de los 15 años de edad, con una mayor proporción de muertes en varones a edades más tempranas en comparación con las mujeres que presentan una menor proporción de muertes con un pico de mortalidad a partir de los 80 años de edad (Gráfico 12).

La mortalidad proporcional prácticamente no difiere en varones y mujeres antes de los 15 años de edad. Las muertes en la población de 5 a 14 años representaron el 0,5% del total de defunciones ocurridas en el 2013 (Gráfico).

**Gráfico 12. Mortalidad proporcional según sexo y grupos de edad. Argentina. Año 2013**



Fuente: DEIS

Por lo anteriormente expuesto, la mortalidad en la población de 5 a 14 años es poco frecuente.


### Causas de mortalidad más frecuentes

Las principales causas de muerte en los niños/as y adolescentes de 5 a 14 años, tanto en los varones como en las mujeres fueron los accidentes, los tumores malignos y las malformaciones congénitas. En ellas, la tasa de mortalidad fue mayor en los varones que en las mujeres. Esta diferencia es aún mayor en el caso de los accidentes, principal causa de muerte en este grupo de edad, en el cual el riesgo de morir en varones es un 70% mayor que en las mujeres (Riesgo relativo = 1,68) (Gráfico 13)

Otras causas frecuente de muerte en este grupo de edad son los eventos de intención no determinada, es decir causas externas cuya intención no fue explicitada, es decir que no se puede determinar si fue intencional o no intencional. En quinto lugar en frecuencia se encuentran los suicidios y luego las infecciones respiratorias agudas bajas. En ambos casos la tasa de mortalidad en varones y en mujeres es similar (gráfico 13)

Lo más llamativo en este grupo etario es el predominio de las causas externas como causas de defunción, ya que los accidentes, los eventos de intención no determinada y los suicidios conforman las principales causas de muerte. Y, excepto en los suicidios, existe un predominio del riesgo en los varones por sobre las mujeres (Gráfico 13).


**Gráfico 13. Tasa de mortalidad (por cien mil habitantes) de las principales causas de defunción en niños/as y adolescentes de 5 a 14 años según sexo. Argentina. Año 2013**



Fuente: DEIS

**Gráfico 14. Mortalidad Proporcional de las causas de defunción en niños/as y adolescentes de 5 a 14 años. Argentina. Año 2013**

(n= 1.536)



Fuente: DEIS

Del total de muertes ocurridas en niños/as y adolescentes de 5 a 14 años, los accidentes, los suicidios y los eventos de intención no determinada representaron el 36,5% de todas las muertes. Siguió en frecuencia los tumores y las malformaciones congénitas. En ambos casos, la proporción fue mucho menor que en el caso de las causas externas (Gráfico 14).

#### Principales causas de egreso hospitalario

A continuación se analizarán los egresos hospitalarios de establecimientos oficiales del país, cuyos últimos datos disponibles corresponden al año 2010. Es de destacar que en el análisis no se encuentran incluidos los egresos de efectores privados o de la seguridad social, ya que no se disponen de dichos datos. Es decir que los niños/as que cuentan con cobertura de salud privada o por obras sociales que estuvieron internados en efectores de su cobertura de salud, no formarán parte del análisis.

En el año 2010 se produjeron 2.049.950 egresos hospitalarios de establecimientos públicos del país, de los cuales 147.550 (7,2%) egresos correspondieron a niños/as y adolescentes de 5 a 14 años (Tabla 5).


**Tabla 5. Indicadores de egresos hospitalarios según grupos de edad. Argentina. Año 2010**

Indicadores	5 a 9	10 a 14	5 a 14
N° total de niños/as de Argentina	3.381.219	3.503.446	6.884.665
N° de niños/as de con cobertura únicamente estatal	1.534.869	1.602.549	3.137.418
N° Egresos Hospitalarios de establecimientos oficiales	74.410	73.140	147.550
Proporción sobre el total de egresos	3,6	3,6	7,2

Fuente: INDEC. Censo 2010 y DEIS

De cada 100 egresos hospitalarios en varones, 10 fueron niños y adolescentes de 5 a 14 años y de cada 100 egresos en mujeres, solo 5 fueron niñas y adolescentes de 5 a 14 años (Gráfico 15).

**Gráfico 15. Distribución porcentual de los egresos hospitalarios según sexo y grupos de edad. Argentina. Año 2013**



Fuente: DEIS

Los diagnósticos de egresos más frecuentes en el grupo de 5 a 14 años fueron las causas externas, seguido de las enfermedades del sistema respiratorio (Gráfico 16).

Entre las causas externas, los diagnósticos más frecuentes fueron los traumatismos, principalmente de miembros (superiores e inferiores), de cabeza y cuello y múltiples. En menor frecuencia los egresos se debieron a envenenamientos y efectos tóxicos y a quemaduras y congelamientos.


En las enfermedades del sistema respiratorio predominaron los egresos por neumonía e influenza y por asma.

En las enfermedades del sistema digestivo se presentó un predominio de las enfermedades del apéndice.

Finalmente, entre las enfermedades infecciosas y parasitarias, las infecciones intestinales se presentaron con mayor frecuencia como motivo de egreso hospitalario.

**Gráfico 16. Distribución porcentual de las causas de egreso hospitalario de establecimientos oficiales en niños/as y adolescentes de 5 a 14 años. Argentina. Año 2013**

(n= 147.550)



Fuente: DEIS

Los motivos de egreso hospitalario fueron diferentes según los grupos de edad. En los niños/as de 5 a 9 años, el

diagnóstico más frecuente fueron las enfermedades del sistema respiratorio, seguido de las causas externas y de los síntomas, signos y hallazgos clínicos y de laboratorio. A diferencia del grupo de 10 a 14 años, las malformaciones congénitas ocupan un lugar, aunque poco frecuente, como motivo de egreso hospitalario (Tabla 6).

En el grupo de 10 a 14 años predominaron las causas externas como diagnóstico más frecuente de egreso hospitalario, seguido de los síntomas, signos y hallazgos clínicos y de laboratorio y de las enfermedades del aparato digestivo. A diferencia de los niños/as de 5 a 9 años, las enfermedades respiratorias presentaron una frecuencia menor ubicándose como cuarta causa de egreso hospitalario. El embarazo, parto y puerperio comienza a ganar un lugar en los motivos de egresos, ubicándose como quinto motivo de egreso en frecuencia (Tabla 6).

**Tabla 6. Distribución porcentual de las causas de egreso hospitalario de establecimientos oficiales según grupos de edad. Argentina. Año 2013**

Causa de Egreso por Capítulo de CIE-10 5 a 9 años			Causa de Egreso por Capítulo de CIE-10 10 a 14 años		
		%			%
1°	Enfermedades del sistema respiratorio	21,2	1°	Causas externas	21,7
2°	Causas externas	20,3	2°	Síntomas, signos y hallazgos clínicos y de laboratorio	14,1
3°	Síntomas, signos y hallazgos clínicos y de laboratorio	13,0	3°	Enfermedades del sistema digestivo	13,9
4°	Enfermedades del sistema digestivo	11,0	4°	Enfermedades del sistema respiratorio	11,2
5°	Enfermedades infecciosas y parasitarias	8,8	5°	Embarazo, parto y puerperio	6,0
6°	Enfermedades del sistema genitourinario	4,1	6°	Enfermedades infecciosas y parasitarias	6,0
7°	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3,7	7°	Enfermedades del sistema genitourinario	4,5
8°	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2,7	8°	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3,5
9°	Tumores	2,7	9°	Tumores	2,8
10°	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2,5	10°	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2,6
	Resto de las causas	10,0		Resto de las causas	13,7

Fuente: DEIS

## 5. Análisis de los problemas de salud prevalentes de los niñas, niños y adolescentes de escuelas de nivel primario

A continuación se analizarán los problemas de salud detectados en la población de niños/as y adolescentes de las escuelas de nivel primario que fueron evaluados en el marco del PROSANE.

Se analizarán las principales características de la población y la frecuencia de eventos de salud clasificados como: hallazgos clínicos, antropométricos, fonoaudiológicos, oftalmológicos y odontológicos.


También se expone la metodología utilizada para el análisis de los datos y la definición de las variables analizadas.

### a. Población evaluada:

En el año 2013 se evaluaron 184.700 niños/as y adolescentes en 19 provincias de todo el país. Del total, 181.973 (98,5%) presentaron datos completos en las variables del examen físico (Gráfico 17).

La mayor parte de los niños/as y adolescentes evaluados tienen entre 5 y 13 años de edad, ascendiendo a 174.294 (95.214 niños/as de 5 a 9 años y 79.080 adolescentes de 10 a 13 años).

**Gráfico 17. Niños/as y adolescentes evaluados por el PROSANE en Argentina. Año 2013**



Fuente: PROSANE

A continuación se presentarán los datos analizados de la población de niños/as y adolescentes de 5 a 13 años que presentaron un examen físico completo.

### b. Aspectos metodológicos

#### Definición de las variables:

##### Examen físico completo:

Planilla de datos del Control Integral de Salud, "C.I.S" completa, es decir con todas las variables del examen físico completo, que incluye hallazgos clínicos dermatológicos, cardiovasculares, respiratorios, genitourinarios, abdominales, osteoarticulares y neurológicos.

Se excluyeron aquellas fichas que contienen en el examen físico celdas "sin datos"

##### Datos antropométricos completos:

Planilla de datos del "C.I.S" que contienen los datos completos de peso y talla.

##### Examen fonoaudiológico completo:

Planilla de datos del "C.I.S" que contienen los datos válidos de hipoacusia y trastornos de la fonación.

**Examen oftalmológico completo:**

Planilla de datos del “C.I.S” que contienen los datos válidos de estrabismo y agudeza visual.

**Examen odontológico completo:**

Planilla de datos del “C.I.S” que contienen los datos válidos de maloclusión, índice CEOD e índice CPOD.

**Índice CEOD:**

El índice corresponde a la sumatoria de dientes primarios cariados, con indicación de extracción y obturados.

**Índice CPOD:**

El índice corresponde a la sumatoria de dientes permanentes cariados, perdidos y obturados.

**Escala de calidad del dato:**

Los datos se consideraron aceptables cuando el porcentaje de celdas “sin datos” fue menor al 20%. Cuando el porcentaje de celdas vacías superó el 20% se consideró inaceptable y se excluyó del análisis.

En el Anexo 2 se detallan las provincias que presentaron una baja calidad del dato y cuyas variables fueron excluidas del análisis.

**Bajo peso al nacer:**

Peso al nacer (referido por los padres) menor a 2.500 gr.

**Carnet completo de vacunación:**

Planilla de datos del “C.I.S” en las cuales se registró que los niños/as y adolescentes trajeron el carnet de vacunación y en los cuales no resta aplicar ninguna vacuna.

**Cobertura únicamente estatal:**

Planilla de datos del “C.I.S” donde los padres registraron que no poseen cobertura de salud.

**Repitencia:**

Alumno que cursa por segunda o más veces el mismo año de estudio o ciclo, por no haberlo promovido en su anterior oportunidad.

Es completado en la ficha por el docente o directivo a cargo del establecimiento educativo.

**Sobriedad:**

Alumno que tiene más edad que la considerada teóricamente ideal según las normas legales de acceso al sistema educativo para el año de estudio que cursa.

Es completado en la ficha por el docente o directivo a cargo del establecimiento educativo.

**Hallazgos Cardiovasculares:**

Detección de soplos, alteraciones del ritmo cardíaco, alteraciones del pulso y otros hallazgos.

**Hallazgos Respiratorios:**

Detección de sibilancias, asma, infección respiratoria alta, infección respiratoria baja y otros hallazgos.

**Hallazgos Dermatológicos:**

Detección de lesiones hipo o hiperpigmentadas, eczema, impétigo, lesiones compatibles con maltrato y otros hallazgos.

**Hallazgos Genitourinarios en varones:**

Detección de alteración del estadio de Tanner, infecciones urinarias a repetición, alteraciones y enfermedades del pene y uretra, ectopía testicular, hidrocele y otros hallazgos.

**Hallazgos Genitourinarios en mujeres:**

Detección de alteración del estadio de Tanner, infecciones urinarias a repetición y otros hallazgos.

**Hallazgos Abdominales:**

Detección de hepatomegalia, esplenomegalia, hernias, masa palpable y otros hallazgos.

**Hallazgos Osteoarticulares:**

Detección de desviación de la columna, patología del pie, alteraciones de la marcha y otros hallazgos.

**Hallazgos Neurológicos:**

Detección de retraso del desarrollo madurativo, convulsiones y otros hallazgos.

**Patología de piezas temporarias:**

Fichas con un registro del índice CEOD mayor a 0

**Patología de piezas definitivas:**

Fichas con un registro del índice CPOD mayor a 0

**Emaciación:**

Niños/as y adolescentes con un Índice de Masa Corporal menor a un puntaje Z de -2,00 para la edad.

Los datos antropométricos fueron analizados con el software de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia.

Calculador antropométrico. Referencia para Argentina 2008. Versión 1.0. Buenos Aires: Ministerio de Salud. 2013.

Disponible en <http://datos.dinami.gov.ar>

**Sobrepeso:**

Niños/as y adolescentes con un Índice de Masa Corporal entre +1,00 y +2,00 de puntaje Z para la edad.

Los datos antropométricos fueron analizados con el software de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia.

Calculador antropométrico. Referencia para Argentina 2008. Versión 1.0. Buenos Aires: Ministerio de Salud. 2013.

Disponible en <http://datos.dinami.gov.ar>

**Obesidad:**

Niños/as y adolescentes con un Índice de Masa Corporal mayor a +2,00 de puntaje Z para la edad.

Los datos antropométricos fueron analizados con el software de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia.

Calculador antropométrico. Referencia para Argentina 2008. Versión 1.0. Buenos Aires: Ministerio de Salud. 2013.

Disponible en <http://datos.dinami.gov.ar>

**Baja Talla:**

Niños/as y adolescentes con una talla para la edad menor a un puntaje Z de -2,00.

Los datos antropométricos fueron analizados con el software de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia.

Calculador antropométrico. Referencia para Argentina 2008. Versión 1.0. Buenos Aires: Ministerio de Salud. 2013.

Disponible en <http://datos.dinami.gov.ar>

**Región Noreste (NEA):**

Incluye a las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.

En el año 2013 participaron del PROSANE las provincias de Corrientes, Formosa y Misiones.

**Región Noroeste (NOA):**

Incluye a las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

Todas las provincias de la región participaron del PROSANE en el año 2013.

**Región Cuyo:**

Incluye a las provincias de La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis.

Todas las provincias de la región participaron del PROSANE en el año 2013.

**Región Patagonia:**

Incluye a las provincias de Chubut, La Pampa, Neuquen, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En el año 2013 participaron las provincias de La Pampa, Neuquen y Tierra del Fuego.

**Región Centro:**

Incluye a Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.

En el año 2013 participaron del PROSANE las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.

**c. Características de la población de niños/as y adolescentes de 5 a 13 años con examen físico completo**

En el año 2013 se evaluaron 174.294 niños/as y adolescentes de 5 a 13 años con examen físico completo. La distribución por sexo fue similar (51% mujeres y 49% varones). En cuanto a los grupos de edad, se presentó un ligero predominio del grupo de 5 a 9 años (54,6%). (Tabla)

La distribución de niños/as y adolescentes evaluados a nivel provincial fue dispar. El 25,4% correspondió a la provincia de Buenos Aires, que presentó la mayor cantidad de niños/as y adolescentes evaluados del país. Entre Ríos, Misiones y Jujuy siguieron en frecuencia (Tabla 7 y Gráfico 18).


**Tabla 7. Distribución de los niños/as y adolescentes por provincias según grupos de edad y sexo. Argentina. Año 2013.**

Provincia	Mujeres 5 a 9 años	Varones 5 a 9 años	Mujeres 10 a 13 años	Varones 10 a 13 años	Total Mujeres	Total Varones	Total 5 a 9 años	Total 10 a 13 años	Total 5 a 13 años	% 5 a 13 años
Buenos Aires	12.515	11.814	10.732	9.248	23.247	21.062	24.330	19.981	44.311	25,4
Catamarca	454	408	458	350	912	758	862	808	1.670	1,0
Córdoba	1.809	1.848	1.847	1.779	3.656	3.627	3.658	3.626	7.284	4,2
Corrientes	239	269	184	192	423	461	508	376	884	0,5
Entre Ríos	4.369	4.526	4.500	4.476	8.869	9.002	8.895	8.976	17.871	10,3
Formosa	2.075	2.055	2.170	2.018	4.245	4.073	4.130	4.188	8.318	4,8
Jujuy	3.348	3.378	3.395	3.466	6.743	6.844	6.726	6.861	13.587	7,8
La Pampa	1.864	1.878	1.870	1.751	3.734	3.629	3.742	3.621	7.363	4,2
La Rioja	3.847	3.881	2.128	2.012	5.975	5.893	7.728	4.140	11.868	6,8
Mendoza	1.301	1.303	1.130	1.078	2.431	2.381	2.604	2.208	4.812	2,8
Misiones	3.636	3.744	3.312	3.131	6.948	6.875	7.380	6.443	13.823	7,9
Neuquén	608	654	581	523	1.189	1.177	1.262	1.104	2.366	1,4
Salta	1.217	1.274	1.277	1.106	2.494	2.380	2.491	2.383	4.874	2,8
San Juan	2.286	2.378	2.055	1.810	4.341	4.188	4.664	3.865	8.529	4,9
San Luis	1.674	1.603	1.350	1.153	3.024	2.756	3.277	2.503	5.780	3,3
Santa Fe	3.911	3.770	1.736	1.555	5.647	5.325	7.681	3.291	10.972	6,3
S. Estero	1.403	1.432	1.357	1.194	2.760	2.626	2.835	2.551	5.386	3,1
Tucumán	323	314	270	231	593	545	637	501	1.138	0,7
T. Fuego	884	920	781	873	1.665	1.793	1.804	1.654	3.458	2,0
<b>Total País</b>	<b>47.763</b>	<b>47.449</b>	<b>41.133</b>	<b>37.946</b>	<b>88.896</b>	<b>85.395</b>	<b>95.214</b>	<b>79.080</b>	<b>174.294</b>	<b>100</b>

Nota: se detectaron 3 niños/as sin datos de sexo: 2 corresponden a Buenos Aires y 1 a Córdoba

Fuente: PROSANE

**Gráfico 18. Distribución de los niños/as y adolescentes de 5 a 13 años por provincias de Argentina. Año 2013**



Fuente: PROSANE


**Antecedentes de prematuridad y bajo peso al nacer**

A nivel país el 5,9% de los niños/as y adolescentes refirió antecedentes de prematuridad y el 6,3% refirió antecedentes de bajo peso al nacer. La Región NOA fue la que presentó la mayor proporción de antecedentes de prematuridad, mientras que la región Centro presentó la mayor proporción aunque ligeramente mayor al promedio nacional (Gráfico 19).

A nivel regional la proporción de antecedentes de prematuridad osciló entre el 4,3% en Patagonia y el 7,5% en NOA. La brecha fue de 1,7 y el rango fue de 3,2% (Gráfico 19).

La proporción del antecedente del bajo peso al nacer fluctuó entre el 5% en la región Patagonia y el 6,9% en la región Centro. La brecha fue de 1,38 y el rango de 1,9% (Gráfico 19).

**Gráfico 19. Distribución porcentual de los antecedentes de prematuridad y bajo peso al nacer en la población de 5 a 13 años, según regiones de Argentina. Año 2013**



Fuente: PROSANE


## Repitencia y Sobreedad

En el país, la proporción de niños/as y adolescentes con repitencia fue del 5,4% y con sobreedad del 6,1%. La región NEA y Cuyo presentaron proporciones de repitencia y sobreedad mayores al nivel nacional. La región Patagonia presentó la proporción más baja, tanto de repitencia como de sobreedad (Gráfico 20).

La brecha de sobreedad fue de 4,5 y el rango fue de 8,1% (Gráfico 20).

La brecha de repitencia fue de 2,8 y el rango fue de 6,6% (Gráfico 20).


**Gráfico 20. Distribución porcentual de la repitencia y sobreedad en la población de 5 a 13 años, según regiones de Argentina. Año 2013**



Fuente: PROSANE

La proporción de repitencia y sobreedad difiere en los grupos de edad y sexo. En el grupo de niños/as de 5 a 9 años la proporción es baja, aunque ligeramente mayor en los varones. En los adolescentes de 10 a 13 años la proporción tanto de repitencia como de sobreedad aumentaron, con un mayor predominio en los varones, donde la repitencia y sobreedad alcanzaron el 10% (Gráfico 21).

**Gráfico 21. Distribución porcentual de la repitencia y sobreedad según sexo y grupos de edad. Total país. Año 2013**



Fuente: PROSANE

## d. Problemas de salud más frecuentes


Los problemas de salud detectados en los niños/as y adolescentes se presentaron con distinta frecuencia. Los más prevalentes fueron los hallazgos odontológicos. Casi 4 de cada 10 niños/as en edad escolar presentó patología de las piezas dentarias temporarias y 3 de cada 10, patología de piezas dentarias definitivas. La maloclusión fue muy frecuente y alcanzó el 18% (Gráfico 22).

Los hallazgos antropométricos siguieron en frecuencia, principalmente el sobrepeso y la obesidad que alcanzaron el 37,1% cuando se los consideró en forma conjunta (Gráfico 22).

La disminución de la agudeza visual fue un hallazgo frecuente afectando al 10% de la población (Gráfico 22).

Los hallazgos clínicos abdominales y neurológicos fueron los eventos que se presentaron con menor frecuencia (Gráfico 22).

**Gráfico 22. Distribución porcentual de los problemas de salud más frecuentes en la población de 5 a 13 años. Total país. Año 2013**




Fuente: PROSANE

La distribución de los principales problemas de salud a nivel regional fue variable. La región NEA, Cuyo y Centro presentaron un patrón de frecuencias similar al del país, predominando la patología de piezas temporarias en primer lugar, seguido de la patología de las piezas definitivas, sobrepeso, maloclusión, obesidad y disminución de la agudeza visual. La principal diferencia radicó en la magnitud (Gráfico 23).

La Región NOA y Patagonia presentaron un patrón diferente en frecuencia respecto al país. En NOA, la maloclusión fue más frecuente, ocupando el tercer lugar, y la disminución de la agudeza visual se presentó con mayor frecuencia que la obesidad. En la región Patagonia el sobrepeso fue más frecuente que la patología de las piezas definitivas ocupando el segundo lugar. Asimismo, la obesidad fue más frecuente que la maloclusión. Es decir que el sobrepeso y la obesidad fueron eventos más frecuentes que la patología odontológica, ocupando el segundo y tercer lugar en frecuencia por sobre la patología de piezas definitivas y la maloclusión (Gráfico 23).

La frecuencia de patología de piezas temporarias y definitivas fue mayor en la región Centro y en Cuyo. La región Patagonia y Centro presentó una mayor frecuencia de sobrepeso y obesidad que el total país. La región NOA y en menor medida, la región Cuyo presentaron una mayor proporción de maloclusión respecto al país. Finalmente, en la región NOA y Cuyo, la frecuencia de disminución de la agudeza visual fue mayor que el promedio nacional (Gráfico 23).

**Gráfico 23. Distribución porcentual de los problemas de salud más frecuentes en la población de 5 a 13 años según regiones de Argentina. Año 2013**



Fuente: PROSANE

**Tabla 8. Distribución porcentual de los problemas de salud más frecuentes según sexo y grupos de edad. Total país. Año 2013**

Género	5 a 9 años		10 a 13 años	
	Hallazgos	%	Hallazgos	%
Mujeres	1º Patología Piezas Temporarias	55,3	1º Patología Piezas Definitivas	48,6
	2º Sobrepeso	19,5	2º Sobrepeso	24,4
	3º Patología Piezas Definitivas	15,2	3º Maloclusión	22,3
	4º Maloclusión	14,2	4º Patología Piezas Temporarias	19,9
	5º Obesidad	13,3	5º Obesidad	13,5
Varones	1º Patología Piezas Temporarias	56,4	1º Patología Piezas Definitivas	45,3
	2º Sobrepeso	19,6	2º Patología Piezas Temporarias	23,0
	3º Obesidad	16,6	3º Sobrepeso	22,9
	4º Patología Piezas Definitivas	14,0	4º Maloclusión	22,3
	5º Maloclusión	13,7	5º Obesidad	19,7

Fuente: PROSANE

Si bien los eventos de salud más frecuentes son los mismos, el patrón de distribución cambió según los grupos de edad y sexo. Los hallazgos odontológicos predominan en todos los grupos, pero en los niños/as de 5 a 9 años son más frecuentes la patología de las piezas temporarias y en los niños/as de 10 a 13 años, la patología de las piezas definitivas. El sobrepeso ocupó el segundo lugar en frecuencia en todos los grupos de edad, excepto en los varones de 10 a 13 años que ocupó el tercer lugar en frecuencia. La maloclusión ocupó el tercer lugar en frecuencia en las mujeres de 10 a 13 años, el cuarto lugar en las mujeres de 5 a 9 años y en los varones de 10 a 13 años y el quinto lugar en los varones de 5 a 9 años. La obesidad ocupó el quinto lugar en todos los grupos, excepto en los varones de 5 a 9 años que ocupó el tercer lugar en frecuencia (Tabla 8).


Si bien se tratará cada tema en el capítulo correspondiente, en el Gráfico 24 se analiza la distribución de los principales eventos de salud detectados en cada grupo de edad y sexo. Los hallazgos odontológicos se distribuyen de manera diferente principalmente en los grupos de edad: la patología de las piezas temporarias predominaron en varones y mujeres de 5 a 9 años a tal magnitud que 1 de cada 2 niños/as de este grupo de edad presentó el evento. Por el contrario, la patología de las piezas definitivas y la maloclusión predominó en el grupo de varones y mujeres de 10 a 13 años, llegando a 1 de cada 2 niños/as y 1 de cada 4 niños/as respectivamente (Gráfico 24 y Tabla 9).

A nivel nutricional, el sobrepeso predominó en varones y mujeres de 10 a 13 años, con una magnitud ligeramente mayor en mujeres de 10 a 13 años. La obesidad presentó un patrón de frecuencias diferente al sobrepeso, predominando en varones, por sobre las mujeres en ambos grupos de edad, con una ligera diferencia de magnitud en los varones

mayores (Gráfico 24).

La disminución de la agudeza visual predominó en el grupo de 5 a 9 años, y afectó a 1 de cada 9 años/as de ese grupo etario (Gráfico 24 y Tabla 9).

**Gráfico 24. Distribución porcentual de los problemas de salud más frecuentes según sexo y grupos de edad. Total país. Año 2013**



Fuente: PROSANE

**Tabla 9. Distribución de los problemas de salud más frecuentes según grupos de edad. Total país. Año 2013**

Problemas de salud	5 a 9 años	10 a 13 años
Sobrepeso	1 de cada 5	1 de cada 4
Obesidad	1 de cada 7	1 de cada 6
Patología piezas temporarias	1 de cada 2	1 de cada 5
Patología piezas definitivas	1 de cada 7	1 de cada 2
Maloclusión	1 de cada 7	1 de cada 4
Disminución de la agudeza visual	1 de cada 9	1 de cada 12


Fuente: PROSANE

**e. Problemas de salud específicos de los niños, niñas y adolescentes de escuelas de nivel primario**

## I. Hallazgos clínicos

Los hallazgos clínicos presentaron una baja frecuencia en los niños/as evaluados, con una prevalencia menor al 8%. Los hallazgos clínicos detectados con mayor frecuencia fueron los osteoarticulares, seguidos de los dermatológicos. Los hallazgos abdominales y los neurológicos presentaron una baja frecuencia, menor al 1% (Gráfico 25).

**Gráfico 25. Distribución porcentual de los hallazgos clínicos en la población de 5 a 13 años. Total País. Año 2013**



Fuente: PROSANE

Entre los hallazgos osteoarticulares, el más frecuente fue la patología del pie, seguido por la desviación de la columna. Los hallazgos dermatológicos más frecuentes fueron las lesiones hipo o hiperpigmentadas y en segundo término el eczema. Las lesiones compatibles con maltrato fueron poco frecuentes y se detectaron en 22 niños/as y adolescentes. Sin embargo se destacan por la gravedad que conlleva estos hallazgos.

Los hallazgos genitourinarios fueron más frecuentes en varones que en mujeres. En los varones, las alteraciones del pene y uretra fueron los más frecuentes. En segundo término se ubicó la ectopia testicular. En este sentido, es importante destacar que se detectó esta patología en 352 niños con el impacto a futuro que puede tener su detección tardía.

Los hallazgos cardiovasculares más frecuentes fueron los soplos y la detección de tensión arterial elevada, superior al percentilo 95 para la talla y edad.

Las infecciones respiratorias altas fueron los hallazgos respiratorios más frecuentes, pero este evento presenta un marcado comportamiento estacional y depende del momento del año en el cual se evaluaron a los niños/as en cada escuela. El segundo hallazgo en frecuencia fue asma.

En las mujeres, el hallazgo genitourinario más frecuente fueron las alteraciones del estadio de Tanner y las infecciones urinarias a repetición.

A nivel neurológico, el hallazgo más frecuente fue el retraso del desarrollo madurativo.

Finalmente, los hallazgos abdominales más frecuentes fueron las hernias que se evidenciaron en 165 niños/as y adolescentes.

Los hallazgos clínicos presentaron diferencias a nivel regional. A grandes rasgos, la región NEA se presentó siempre en el último lugar en frecuencia para todos los hallazgos clínicos (Gráficos 26 a 33).

A nivel cardiovascular, la región Cuyo presentó la frecuencia más elevada y junto a la región Patagonia y NOA se ubicaron por encima del valor del total país. Algo similar ocurre con los hallazgos respiratorios, donde estas tres regiones presentan una frecuencia mayor al total país, con un cambio en el orden de frecuencia: en primer lugar se encuentra NOA, luego Patagonia y Cuyo (Gráficos 26 y 27).

A nivel dermatológico, la región Cuyo presentó la mayor frecuencia, duplicando al total país. La región NOA se ubica en segundo lugar (Gráfico 28).


Los hallazgos osteoarticulares fueron los más frecuentes en todas las regiones, excepto en NEA, donde los hallazgos más frecuentes fueron los respiratorios. En Patagonia y Cuyo, los hallazgos osteoarticulares fueron muy frecuentes, superando el 10% de los niños/as evaluados (Gráfico 29).

Los hallazgos genitourinarios fueron más frecuentes en varones que en mujeres. En ambos casos, las regiones NOA y

Patagonia presentaron una frecuencia mayor a la del total país (Gráficos 30 y 31).


Finalmente, los hallazgos abdominales y neurológicos fueron muy poco frecuentes en todas las regiones, y las diferencias entre ellas son mínimas (Gráficos 32 y 33).

**Gráfico 26. Distribución porcentual de los hallazgos clínicos CARDIOVASCULARES según regiones de Argentina. Año 2013**



Fuente: PROSANE

**Gráfico 27. Distribución porcentual de los hallazgos clínicos RESPIRATORIOS según regiones de Argentina. Año 2013**




Fuente: PROSANE

**Gráfico 28. Distribución porcentual de los hallazgos clínicos DERMATOLÓGICOS según regiones de Argentina. Año 2013**




Fuente: PROSANE

**Gráfico 29. Distribución porcentual de los hallazgos clínicos OSTEOARTICULARES según regiones de Argentina. Año 2013**




Fuente: PROSANE

**Gráfico 30. Distribución porcentual de los hallazgos clínicos GENITOURINARIOS en varones según regiones de Argentina. Año 2013**




Fuente: PROSANE

**Gráfico 31. Distribución porcentual de los hallazgos clínicos GENITOURINARIOS en mujeres según regiones de Argentina. Año 2013**




Fuente: PROSANE

**Gráfico 32. Distribución porcentual de los hallazgos clínicos ABDOMINALES según regiones de Argentina. Año 2013**



Fuente: PROSANE

**Gráfico 33. Distribución porcentual de los hallazgos clínicos NEUROLÓGICOS según regiones de Argentina. Año 2013**



Fuente: PROSANE

La distribución de los hallazgos clínicos fue similar en los grupos de edad y sexo, con un patrón caracterizado por la frecuencia de los hallazgos osteoarticulares y dermatológicos en el primer y segundo lugar respectivamente. El tercer lugar en frecuencia fue para los hallazgos cardiovasculares en todos los grupos excepto en las mujeres de 5 a 9 años que ocuparon el cuarto lugar, desplazados por los hallazgos respiratorios (Tabla 10). Los hallazgos genitourinarios estuvieron entre las patologías más frecuentes en todos los grupos de edad, excepto en las mujeres de 5 a 9 años. En los varones de 10 a 13 años ocupó el cuarto lugar en frecuencia (Tabla 10).

**Tabla 10. Distribución porcentual de los hallazgos clínicos más frecuentes según sexo y grupos de edad. Total país. Año 2013**

Género	5 a 9 años		10 a 13 años	
	Hallazgos	%	Hallazgos	%
Mujeres	1º Osteoarticulares	7,2	1º Osteoarticulares	7,9
	2º Dermatológicos	3,7	2º Dermatológicos	3,2
	3º Respiratorios	2,7	3º Cardiovasculares	2,1
	4º Cardiovasculares	2,7	4º Respiratorios	1,7
	5º Neurológicos	0,7	5º Genitourinarios	1,2
Varones	1º Osteoarticulares	8,0	1º Osteoarticulares	7,5
	2º Dermatológicos	3,7	2º Dermatológicos	3,2
	3º Cardiovasculares	3,2	3º Cardiovasculares	2,6
	4º Respiratorios	3,0	4º Genitourinarios	2,5
	5º Genitourinarios	2,8	5º Respiratorios	2,1

Fuente: PROSANE

## II. Hallazgos antropométricos

El sobrepeso y la obesidad fueron los hallazgos antropométricos más frecuentes. En conjunto, se presentaron en el 37,1% de la población de 5 a 13 años. Con menor frecuencia se presentó la baja talla y la emaciación (Gráfico 34).


A nivel regional, se observa que la región Patagonia en primer término, y la región Centro, presentaron frecuencias mayores, tanto de sobrepeso como de obesidad que a nivel país. Las regiones de NOA y Cuyo presentaron frecuencias similares al promedio del país (Gráfico 35).

La región con mayor frecuencia de sobrepeso fue Patagonia, y la región con menor frecuencia fue la región NEA. La brecha fue de 1,22 con un rango de 4,3%. En cuanto a la frecuencia de obesidad, la región con mayor frecuencia fue Patagonia y la de menor frecuencia fue la región NEA con una brecha de 1,75 y con un rango de 8,4% (Gráfico 35).

La frecuencia de baja talla fue mayor en la región NEA donde alcanzó el 4,5%. Esta frecuencia fue mayor a la esperada a nivel poblacional que es del 2,3%. La región Centro sigue en frecuencia llegando al 2,9 % de baja talla. Las regiones Patagonia, NOA y Cuyo presentaron una baja frecuencia de baja talla y se encuentran por debajo del nivel esperado del 2,3% (Gráfico 35).


Finalmente, la frecuencia de emaciación a nivel país, no superó el esperado a nivel poblacional (2,3%). La región NEA presentó la frecuencia más alta mientras que la región Patagonia presentó la menor frecuencia (Gráfico 35).

**Gráfico 34. Distribución porcentual de los hallazgos antropométricos en la población de 5 a 13 años. Total País. Año 2013**



Fuente: PROSANE

**Gráfico 35. Distribución porcentual de los hallazgos antropométricos en la población de 5 a 13 años según regiones de Argentina. Año 2013**



Fuente: PROSANE

La frecuencia de sobrepeso a nivel nacional fue elevada en todas las provincias. Tierra del Fuego fue la provincia con mayor frecuencia de sobrepeso y Tucumán la de menor frecuencia. La brecha fue de 1,47 con un rango de 8,3%. Las provincias de Tierra del Fuego, Neuquén, Buenos Aires, Corrientes, La Pampa, Mendoza y Jujuy presentaron niveles de sobrepeso superiores al promedio nacional (Gráfico 36).

**Gráfico 36. Distribución porcentual de sobrepeso en la población de 5 a 13 años según provincias de Argentina. Año 2013**



Fuente: PROSANE

La frecuencia de obesidad en las provincias también fue muy elevada. Nuevamente Tierra del Fuego presentó la prevalencia más elevada, mientras que Misiones presentó la frecuencia más baja. La brecha fue de 2,19 con un rango de 12,4%. Tierra del Fuego, Neuquén, Buenos Aires, Catamarca, La Pampa, San Juan, Mendoza y Tucumán presentaron frecuencias más altas de obesidad que el promedio nacional (Gráfico 37).

**Gráfico 37. Distribución porcentual de obesidad en la población de 5 a 13 años según provincias de Argentina. Año 2013**



Fuente: PROSANE


Finalmente, la frecuencia de sobrepeso y obesidad es alarmante en todas las provincias del país. Tierra del Fuego presentó la mayor frecuencia, llegando a casi 5 de cada 10 niños/as y adolescentes con sobrepeso u obesidad. En el otro extremo se ubicó Misiones que presentó la frecuencia comparativa más baja. Sin embargo, el nivel de sobrepeso y obesidad fue elevado en todas las provincias. La brecha de sobrepeso y obesidad fue de 1,68 con un rango de 19,8% (Gráfico 38).

**Gráfico 38. Distribución porcentual de sobrepeso y obesidad en la población de 5 a 13 años según provincias de Argentina. Año 2013**



La frecuencia de emaciación a nivel provincial fue baja. La provincia de Formosa presentó la frecuencia más alta, y la provincia de Jujuy, la más baja. La brecha fue de 2,75 y el rango de 2,1%. Las provincias de Formosa, Córdoba, Santiago del Estero, Salta y Catamarca presentaron frecuencias de emaciación que superaron al 2,3% esperado a nivel poblacional (Gráfico 39).

**Gráfico 39. Distribución porcentual de emaciación en la población de 5 a 13 años según provincias de Argentina. Año 2013**



Fuente: PROSANE

La frecuencia de Baja talla a nivel provincial fue heterogénea. Santa Fe y Formosa fueron las provincias con mayor frecuencia de baja talla y Neuquén fue la provincia con menor frecuencia. La brecha fue de 7.28 y el rango de 4,4%. Santa Fe, Formosa, Corrientes y Misiones presentaron frecuencias más elevadas que el promedio nacional. Mientras que Buenos Aires y Santiago del Estero presentaron frecuencias de baja talla muy similares al total país (Gráfico 40).

**Gráfico 40. Distribución porcentual de baja talla en la población de 5 a 13 años según provincias de Argentina. Año 2013**



Fuente: PROSANE


La distribución de los hallazgos antropométricos en los grupos de edad y sexo evidenció que el sobrepeso y la obesidad fueron los problemas detectados con mayor frecuencia. La prevalencia de sobrepeso fue mayor en los adolescentes de 10 a 13 años, principalmente en las mujeres. En los niños/as de 5 a 9 años, si bien presentaron una frecuencia menor de sobrepeso respecto de los mayores, la prevalencia de este hallazgo antropométrico es muy alta llegando a casi el 20% (Gráfico 41).

La frecuencia de obesidad fue mayor en los varones que en las mujeres, y los adolescentes de 10 a 13 años presentaron la mayor prevalencia, llegando a casi el 20% de obesidad en este grupo. La frecuencia de obesidad en las mujeres fue similar en ambos grupos de edad, llegando a poco más de 13%, un valor también elevado (Gráfico 41).

La frecuencia de emaciación, si bien baja, fue mayor en los adolescentes de 10 a 13 años, respecto del grupo de 5 a 9 años, y se presentó con mayor frecuencia en las mujeres de 10 a 13 años (Gráfico 41).

La baja talla presentó un predominio en los varones de 5 a 9 años en los cuales alcanzó casi el 4%. La frecuencia de baja talla fue menor en el grupo de 10 a 13 años respecto del grupo de 5 a 9 años (Gráfico 41).

**Gráfico 41. Distribución porcentual de los hallazgos antropométricos según sexo y grupos de edad. Total país. Año 2013**




Fuente: PROSANE

### III. Hallazgos oftalmológicos

Los principales hallazgos oftalmológicos fueron la disminución de la agudeza visual y el estrabismo. La primera fue la que se presentó con mayor frecuencia en todo el país, llegando a casi el 10% de los niños/as evaluados/as. La región NOA presentó la mayor frecuencia de disminución de la agudeza visual, duplicando la frecuencia presentada a nivel país. Por el contrario, la región NOA presentó la menor frecuencia. La brecha entre ambas regiones fue de 9,7 con un rango de 17,4% (Gráfico 42).

Por el contrario, la frecuencia de estrabismo fue baja en todas las regiones. La Región NOA y NEA presentaron las frecuencias más elevadas y la región Patagonia la frecuencia más baja. La brecha entre las regiones fue de 3,2 y el rango de 1,1% (Gráfico 42).


**Gráfico 42. Distribución porcentual de los hallazgos oftalmológicos en la población de 5 a 13 años según regiones de Argentina. Año 2013**



Fuente: PROSANE

A nivel provincial, la provincia de Jujuy presentó la mayor frecuencia de disminución de la agudeza visual, seguido de Mendoza. La provincia de Formosa presentó la menor frecuencia. La brecha fue de 12,7 y el rango de 21,1%. Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, La Pampa y Formosa presentaron frecuencias inusualmente bajas respecto del resto de las provincias (Gráfico 43).


**Gráfico 43. Distribución porcentual de la disminución de la agudeza visual en la población de 5 a 13 años según provincias de Argentina. Año 2013**



Fuente: PROSANE

La frecuencia de Estrabismo fue baja en todas las provincias. Corrientes presentó la frecuencia más elevada, mientras que La Rioja presentó la frecuencia más baja. La brecha fue de 8,6 y el rango de 2,3% (Gráfico 44).


**Gráfico 44. Distribución porcentual de estrabismo en la población de 5 a 13 años según provincias de Argentina. Año 2013**



Fuente: PROSANE

La distribución por grupos de edad y sexo muestra que la disminución de la agudeza visual fue el hallazgo oftalmológico más frecuente con un predominio en los niños/as de 5 a 9 años. Los varones de 10 a 13 años presentaron la frecuencia más baja de disminución de la agudeza visual. El estrabismo presentó una frecuencia muy baja y similar en todos los grupos de edad, con un ligero predominio en los niños/as de 5 a 9 años (Gráfico 45).

**Gráfico 45. Distribución porcentual de los hallazgos oftalmológicos según sexo y grupos de edad. Total país. Año 2013**




Fuente: PROSANE

#### IV. Hallazgos fonoaudiológicos

Los hallazgos fonoaudiológicos evaluados fueron los trastornos de la fonación y la hipoacusia. Los trastornos de la fonación fueron los más frecuentes y se presentaron en casi el 4% de la población a nivel país. La región NOA presentó la mayor frecuencia de trastornos de la fonación y la región Patagonia la que presentó la menor frecuencia. La brecha entre ambas regiones fue de 4.07 y el rango fue de 4,3%. La región NOA y Centro presentaron frecuencias más elevadas de trastornos de la fonación que el promedio nacional (Gráfico 46).

La detección de hipoacusia a nivel nacional fue baja, llegando al 1% a nivel país. La región NOA y NEA presentaron frecuencias ligeramente más altas que el promedio nacional. La región Patagonia presentó la frecuencia de hipoacusia más baja (Gráfico 46).


**Gráfico 46. Distribución de los hallazgos fonoaudiológicos en la población de 5 a 13 años según regiones de Argentina. Año 2013**



Fuente: PROSANE

A nivel provincial se observa que la provincia de Tucumán presentó la mayor frecuencia de trastornos de la fonación, distante de Buenos Aires que continúa en frecuencia. La Rioja y Entre Ríos presentaron la menor frecuencia. La brecha fue de 16,7 y el rango fue de 12,6% (Gráfico 47).


**Gráfico 47. Distribución porcentual de trastornos de la fonación en la población de 5 a 13 años según provincias de Argentina. Año 2013**



Fuente: PROSANE

La frecuencia de hipoacusia a nivel provincial fue baja. San Luis presentó la mayor frecuencia y Entre Ríos la frecuencia más baja (Gráfico 48).

**Gráfico 48. Distribución porcentual de hipoacusia en la población de 5 a 13 años según provincias de Argentina. Año 2013**




Fuente: PROSANE

En la distribución por grupos de edad y sexo, los niños/as de 5 a 9 años presentaron una mayor frecuencia de trastornos de la fonación respecto de los niños/as mayores, con un predominio de los varones. Los varones y mujeres de 10 a 13 años presentaron una frecuencia de trastornos de la fonación similar, cercana al 1% (Gráfico 49).

La frecuencia de hipoacusia fue similar en todos los grupos de edad y sexo y se ubicó en alrededor del 1% (Gráfico 49).

**Gráfico 49. Distribución porcentual de los hallazgos fonoaudiológicos según sexo y grupos de edad. Total país. Año 2013**



Fuente: PROSANE


#### Detección de hipoacusia mediante audiometría

Es importante destacar que los métodos diagnósticos para la detección de hipoacusia utilizados a nivel provincial fueron heterogéneos y se utilizó la prueba de Tato (o voz cuchicheada), el diapasón y/o la audiometría según la disponibilidad de cada jurisdicción. La audiometría convencional y la de barrido tonal se consideran las pruebas de elección para la detección de hipoacusia.

En el año 2013 se realizaron un total de 24.465 audiometrías en niños/as y adolescentes de 5 a 13 años. Las mismas se realizaron en diversas provincias, pero no de manera universal, es decir que no se realizaron como método de detección en toda la población evaluada. De la totalidad de las provincias, Mendoza no realizó audiometrías y las provincias de La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego no informaron acerca de la realización o no de las mismas.

A nivel país, el 16% de los niños/as y adolescentes se evaluó mediante audiometría, pero a nivel provincial fue muy heterogénea. La provincia de Misiones fue la única provincia que implementó la evaluación con audiometría a casi la totalidad de la población evaluada, llegando a aproximadamente el 80% de la población. La prevalencia de hipoacusia entre los niños/as evaluados con audiometría en Misiones fue del 1,4% (Gráfico 50).

**Gráfico 50. Distribución porcentual la realización de audiometrías en la población de 5 a 13 años según provincias de Argentina. Año 2013**



Fuente: PROSANE

#### V. Hallazgos odontológicos

Los hallazgos odontológicos fueron los eventos más frecuentemente detectados. La patología de las piezas temporarias y definitivas, que incluye a las piezas dentarias cariadas, perdidas y obturadas, fueron los hallazgos más frecuentes (Gráfico).


La patología de las piezas temporarias fue más frecuente que la patología de las piezas definitivas, pero debe tenerse en cuenta que la población estudiada presentó un ligero predominio de los niños/as de 5 a 9 años por sobre los adolescentes de 10 a 13 años.

A nivel país, casi el 40% de los niños/as y adolescentes presentaron patología de las piezas temporarias. La región Centro presentó la mayor frecuencia, seguida de la región Cuyo. La región Patagonia presentó la menor frecuencia. La brecha para la patología de las piezas temporarias fue de 1,39 y el rango fue de 13,2% (Gráfico).

La patología de las piezas definitivas se presentó en casi el 30% a nivel país. La región Centro presentó la frecuencia más alta y la región Patagonia la frecuencia más baja. La brecha fue de 1,95 y el rango fue de 18,1% (Gráfico 51).

La maloclusión fue el hallazgo odontológico menos frecuente. A nivel país afectó a poco menos del 18% de los niños/as. La región Cuyo presentó la frecuencia más elevada y la región NEA la frecuencia más baja. La brecha fue de 1,25 y el rango de 3,8% (Gráfico 51).

**Gráfico 51. Distribución porcentual de los hallazgos odontológicos en la población de 5 a 13 años según regiones de Argentina. Año 2013**




Fuente: PROSANE

A nivel provincial se observa que solo 11 provincias presentaron datos completos de la patología de las piezas temporarias. Corrientes fue la provincia que presentó la mayor frecuencia, llegando a más 5 de cada 10 niños/as con patología de piezas temporarias. Santiago del Estero presentó la más baja. La brecha fue de 2,89 y el rango fue de 34% (Gráfico 52).

La patología de las piezas definitivas presentó una distribución similar. Solo 12 provincias presentaron datos completos. Salta presentó la frecuencia más alta, seguida de Corrientes. Santiago del Estero presentó la frecuencia más baja. La brecha fue de 3,3 y el rango fue de 32,8% (Gráfico 53).

**Gráfico 52. Distribución porcentual de la patología de piezas temporarias en la población de 5 a 13 años según provincias de Argentina. Año 2013**



Fuente: PROSANE


**Gráfico 53. Distribución porcentual de la patología de piezas definitivas en la población de 5 a 13 años según provincias de Argentina. Año 2013**



Fuente: PROSANE

La frecuencia de maloclusión a nivel provincial fue heterogénea. Corrientes presentó una frecuencia muy elevada que resulta sumamente llamativa, llegando a casi el 70% de niños/as con maloclusión. Sigue en frecuencia la provincia de Tucumán y la provincia de Neuquén. La frecuencia más baja se presentó en las provincias de Misiones y La Pampa. La brecha fue de 7,32 y la brecha fue de 59,5%. (Gráfico 54).


**Gráfico 54. Distribución porcentual de Maloclusión en la población de 5 a 13 años según provincias de Argentina. Año 2013**



Fuente: PROSANE

En el análisis de la distribución por sexo y grupos de edad, la patología de las piezas temporarias predominó en los niños/as de 5 a 9 años y la patología de las piezas definitivas en los mayores, al igual que la maloclusión. Prácticamente no se detectaron diferencias entre los varones y las mujeres para los hallazgos odontológicos (Gráfico 55).

**Gráfico 55. Distribución porcentual de los hallazgos odontológicos según sexo y grupos de edad.**



Fuente: PROSANE

## 6. Conclusiones

- Los determinantes sociales de la salud se definen como las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Las condiciones de vida de una población determinan su proceso salud enfermedad atención. Los indicadores demográficos y socioeconómicos reflejan las condiciones de vida de una comunidad. En nuestro país se observan distribuciones heterogéneas de los indicadores demográficos, socioeconómicos y educativos en las diferentes provincias. Los indicadores a nivel nacional brindan un promedio de las distintas realidades provinciales. En ocasiones quedan ocultas detrás de los promedios nacionales.
- La población de la República Argentina es una población joven. Aproximadamente 10 de cada 100 habitantes tienen entre 6 y 11 años. Las provincias de la región centro se caracterizan por poseer poblaciones más envejecidas con una menor proporción de niños en edad escolar primaria y poseen indicadores socioeconómicos más favorables. Lo contrario ocurre con las provincias del noreste y noroeste que presentan poblaciones jóvenes con alta proporción de niños/as en edad escolar y con indicadores socioeconómicos más desfavorables.
- Más de 4 millones de niños/as de 6 a 11 años asisten a más de 23.000 escuelas primarias del país. La tasa de escolarización de Argentina es elevada y mantiene un alto nivel en todas las provincias.

La oferta educativa a nivel país se caracteriza por un predominio de la gestión estatal, con una oferta de educación especial del 6% y con una distribución rural/urbana similar. Las escuelas interculturales bilingües predominan en las regiones noreste y noroeste del país.

Las regiones del noreste y noroeste poseen unidades educativas mayormente estatales y rurales.

- Los eventos de salud que causan la muerte o requieren internación son poco frecuentes en los niños/as y adolescentes de 5 a 13 años en comparación con los otros grupos etarios. Las principales causas de muerte son las causas externas con un predominio de los varones por sobre las mujeres. Siguen en frecuencia los tumores malignos y las malformaciones congénitas. Los principales motivos de egreso hospitalario en establecimientos oficiales son las causas externas y las enfermedades respiratorias. Las causas externas son más frecuentes en los adolescentes de 10 a 14 años, mientras que las enfermedades respiratorias son más frecuentes en los niños/as de 5 a 9 años.
- PROSANE evaluó cerca de 200.000 niños/as y adolescentes en 19 provincias del país en el año 2013. Del total de la población evaluada, el 25% correspondió a la provincia de Buenos Aires, seguida por las provincias de Entre Ríos, Misiones y Jujuy.

La distribución por sexo y edad fue similar con un ligero predominio de los niños/as de 5 a 9 años por sobre los adolescentes de 10 a 13 años. La frecuencia de antecedentes de prematuridad y de bajo peso al nacer referido por los padres fue del 6%.

La frecuencia de repitencia fue del 5% y de sobreedad del 6%. En los adolescentes de 10 a 13 años la frecuencia trepó al 10% con un predominio en los varones.

- Los problemas de salud más frecuentes a nivel país fueron los odontológicos, el sobrepeso y la obesidad y la disminución de la agudeza visual. El mismo patrón se presentó en todas las regiones y en todos los grupos de edad.

- Si bien los hallazgos clínicos fueron poco prevalentes, los osteoarticulares y los dermatológicos se presentaron con mayor frecuencia.

Los hallazgos osteoarticulares más frecuentes fueron la patología del pie y la desviación de la columna. Los hallazgos dermatológicos más frecuentes fueron las lesiones hipo o hiperpigmentadas y el eczema.

A nivel regional, todas presentaron el mismo perfil de frecuencia a excepción de la región Noreste donde predominaron los hallazgos respiratorios.

En todos los grupos de edad y sexo también predominaron los hallazgos osteoarticulares y los dermatológicos en segundo lugar.

- El sobrepeso y la obesidad fueron los hallazgos antropométricos más frecuentes, superando los valores poblacionales esperados en todas las provincias del país y en todos los grupos de edad y sexo. Cuatro de cada diez niños/as y adolescentes evaluados presentaron sobrepeso u obesidad.

La región Patagónica presentó la frecuencia más elevada seguida de la región centro. Las provincias de Tierra del Fuego y Neuquén presentaron la prevalencia más alta. El sobrepeso fue más frecuente en los adolescentes y la obesidad presentó un predominio en los varones de ambos grupos de edad.

La baja talla y la emaciación fueron hallazgos poco frecuentes. La región noreste presentó la mayor frecuencia, tanto de baja talla como de emaciación. La emaciación fue ligeramente más frecuente en los adolescentes y la baja talla en los varones de 5 a 9 años.

La provincia de Formosa presentó la frecuencia más elevada de emaciación (3,3%) y las provincias de Santa Fe y Formosa, presentaron la frecuencia más alta de baja talla.

- El hallazgo oftalmológico más frecuente fue la disminución de la agudeza visual, que afectó al 10% de la población evaluada. La región noroeste y las provincias de Jujuy y Mendoza presentaron la frecuencia más elevada. Los niños/as de 5 a 9 años presentaron una frecuencia mayor que los adolescentes.

El estrabismo se detectó con menor frecuencia, afectando al 1,1% de la población evaluada. Las provincias de Corrientes y Salta fueron las provincias que presentaron la frecuencia más elevada. No se detectaron diferencias entre los grupos de edad y sexo.

- Los hallazgos fonoaudiológicos más frecuentes fueron los trastornos de la fonación que presentaron a nivel país una prevalencia del 3,7%. A nivel regional la frecuencia más elevada fue en el noroeste. La provincia de Tucumán presentó la frecuencia más elevada, llegando al 13,4% de la población evaluada. Los trastornos de la fonación fueron más frecuentes en los niños/as de 5 a 9 años.

La hipoacusia fue un hallazgo menos frecuente. La audiometría es el método de elección para la detección de esta patología. Solo la provincia de Misiones realizó audiometría como método de detección a la mayor parte de la población, llegando a un 78,4% de cobertura y presentó un 1,4% de frecuencia de hipoacusia en la población evaluada.

- Los hallazgos odontológicos fueron los problemas de salud más frecuentes, en todas las regiones y en todos los grupos de edad y sexo.

La patología de las piezas temporarias y definitivas afectaron al 39,4% y al 29,4% de la población respectivamente y la región Centro presentó los niveles más elevados. A nivel provincial, las frecuencias más altas se detectaron en las provincias de Corrientes y Salta.

La maloclusión afectó al 17,8% de la población y fue más frecuente en las regiones Patagonia y Cuyo.

En los niños/as de 5 a 9 años fue más frecuente la patología de piezas temporarias, mientras que en los adolescentes predominó la patología de las piezas definitivas y la maloclusión.

- La población de niños, niñas y adolescentes se representa como una población sana ya que los eventos graves que requieren internaciones o causan la muerte son muy poco frecuentes. Sin embargo, esta población presenta una alta prevalencia de problemas de salud tales como el sobrepeso y la obesidad, los problemas odontológicos y los problemas oftalmológicos, entre otros, que tienen un efecto en su salud en el corto, mediano y largo plazo en el transcurrir de la vida de estos niños/as, futuros jóvenes y adultos.

Es importante conocer el perfil sanitario de esta población y actuar en consecuencia, para que los niños/as y adolescentes puedan crecer y desarrollarse con salud en su pleno potencial.

En el marco de construir el acceso al derecho a la salud y a la educación de niñas, niños y adolescentes de todo el país, el Programa Nacional de Salud Escolar (PROSANE) resulta ser una de las estrategias sanitarias para la población de los niveles inicial, primario y secundario del sistema educativo y constituye una herramienta igualadora y fundamental para la detección y prevención de enfermedades y sobre todo para la promoción de la salud. Mediante el fortalecimiento de "Políticas Integradas Salud-Educación", es posible mejorar las condiciones de salud de niños, niñas y adolescentes, incidiendo en su formación integral, haciendo énfasis en el desarrollo de competencias que les permitan conocer y modificar los determinantes de la salud.

## 7. Lista de mapas, gráficos y tablas

---

### Lista de mapas:

- Mapa 1. República Argentina por provincia. Población total. Año 2010.

### Lista de gráficos:

- Gráfico 1. Pirámide de población: estructura por edad y sexo. Total del país. Año 2010.
- Gráfico 2. Índice de envejecimiento. Provincias de Argentina. Año 2010.
- Gráfico 3. Distribución porcentual de la población mayor de 10 años analfabeta. Provincias de Argentina. Año 2010.
- Gráfico 4. Distribución porcentual de la población de 5 a 14 años con cobertura únicamente estatal según provincias de Argentina. Año 2010
- Gráfico 5. Distribución porcentual de los hogares con al menos un indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) según provincias de Argentina. Año 2010
- Gráfico 6. Distribución porcentual de las unidades de educación común según tipo de educación. Provincias de Argentina. Año 2013
- Gráfico 7. Distribución porcentual de las unidades de educación común según sector de gestión. Provincias de Argentina. Año 2013
- Gráfico 8. Distribución porcentual de las unidades de educación común según ámbito.  
Provincias de Argentina. Año 2013
- Gráfico 9. N° de unidades educativas de modalidad intercultural bilingüe de nivel primario. Provincias de Argentina. Año 2012
- Gráfico 10. Eventos de salud en los niños/as y adolescentes según frecuencia y gravedad.
- Gráfico 11. Tasa de Mortalidad (por mil habitantes) según grupos de edad. Argentina. Año 2013.
- Gráfico 12. Mortalidad proporcional según sexo y grupos de edad. Argentina. Año 2013.
- Gráfico 13. Tasa de mortalidad (por cien mil habitantes) de las principales causas de defunción en niños/as y adolescentes de 5 a 14 años según sexo. Argentina. Año 2013.
- Gráfico 14. Mortalidad Proporcional de las causas de defunción en niños/as y adolescentes de 5 a 14 años. Argentina. Año 2013.
- Gráfico 15. Distribución porcentual de los egresos hospitalarios según sexo y grupos de edad. Argentina. Año 2013.
- Gráfico 16. Distribución porcentual de las causas de egreso hospitalario de establecimientos oficiales en niños/as y adolescentes de 5 a 14 años. Argentina. Año 2013
- Gráfico 17. Niños/as y adolescentes evaluados por el PROSANE en Argentina. Año 2013.
- Gráfico 18. Distribución de los niños/as y adolescentes de 5 a 13 años por provincias de Argentina. Año 2013.
- Gráfico 19. Distribución porcentual de los antecedentes de prematurez y bajo peso al nacer en la población de 5 a 13 años, según regiones de Argentina. Año 2013.
- Gráfico 20. Distribución porcentual de la repitencia y sobreedad en la población de 5 a 13 años, según regiones de Argentina. Año 2013.
- Gráfico 21. Distribución porcentual de la repitencia y sobreedad según sexo y grupos de edad. Total país. Año

2013.

- Gráfico 22. Distribución porcentual de los problemas de salud más frecuentes en la población de 5 a 13 años. Total país. Año 2013.
- Gráfico 23. Distribución porcentual de los problemas de salud más frecuentes en la población de 5 a 13 años según regiones de Argentina. Año 2013.
- Gráfico 24. Distribución porcentual de los problemas de salud más frecuentes según sexo y grupos de edad. Total país. Año 2013.
- Gráfico 25. Distribución porcentual de los hallazgos clínicos en la población de 5 a 13 años. Total País. Año 2013.
- Gráfico 26. Distribución porcentual de los hallazgos clínicos CARDIOVASCULARES según regiones de Argentina. Año 2013.
- Gráfico 27. Distribución porcentual de los hallazgos clínicos RESPIRATORIOS según regiones de Argentina. Año 2013.
- Gráfico 28. Distribución porcentual de los hallazgos clínicos DERMATOLÓGICOS según regiones de Argentina. Año 2013.
- Gráfico 29. Distribución porcentual de los hallazgos clínicos OSTEOARTICULARES según regiones de Argentina. Año 2013.
- Gráfico 30. Distribución porcentual de los hallazgos clínicos GENITOURINARIOS en varones según regiones de Argentina. Año 2013.
- Gráfico 31. Distribución porcentual de los hallazgos clínicos GENITOURINARIOS en mujeres según regiones de Argentina. Año 2013.
- Gráfico 32. Distribución porcentual de los hallazgos clínicos ABDOMINALES según regiones de Argentina. Año 2013.
- Gráfico 33. Distribución porcentual de los hallazgos clínicos NEUROLÓGICOS según regiones de Argentina. Año 2013.
- Gráfico 34. Distribución porcentual de los hallazgos antropométricos en la población de 5 a 13 años. Total País. Año 2013.
- Gráfico 35. Distribución porcentual de los hallazgos antropométricos en la población de 5 a 13 años según regiones de Argentina. Año 2013.
- Gráfico 36. Distribución porcentual de sobrepeso en la población de 5 a 13 años según provincias de Argentina. Año 2013.
- Gráfico 37. Distribución porcentual de obesidad sobrepeso en la población de 5 a 13 años según provincias de Argentina. Año 2013.
- Gráfico 38. Distribución porcentual de sobrepeso y obesidad en la población de 5 a 13 años según provincias de Argentina. Año 2013.
- Gráfico 39. Distribución porcentual de emaciación en la población de 5 a 13 años según provincias de Argentina. Año 2013.
- Gráfico 40. Distribución porcentual de baja talla en la población de 5 a 13 años según provincias de Argentina. Año 2013.
- Gráfico 41. Distribución porcentual de los hallazgos antropométricos según sexo y grupos de edad. Total país. Año 2013.
- Gráfico 42. Distribución porcentual de los hallazgos oftalmológicos en la población de 5 a 13 años según regiones de Argentina. Año 2013.

- Gráfico 43. Distribución porcentual de la disminución de la agudeza visual en la población de 5 a 13 años según provincias de Argentina. Año 2013.
- Gráfico 44. Distribución porcentual de estrabismo en la población de 5 a 13 años según provincias de Argentina. Año 2013.
- Gráfico 45. Distribución porcentual de los hallazgos oftalmológicos según sexo y grupos de edad. Total país. Año 2013.
- Gráfico 46. Distribución de los hallazgos fonoaudiológicos en la población de 5 a 13 años según regiones de Argentina. Año 2013.
- Gráfico 47. Distribución porcentual de trastornos de la fonación en la población de 5 a 13 años según provincias de Argentina. Año 2013.
- Gráfico 48. Distribución porcentual de hipoacusia en la población de 5 a 13 años según provincias de Argentina. Año 2013.
- Gráfico 49. Distribución porcentual de los hallazgos fonoaudiológicos según sexo y grupos de edad. Total país. Año 2013.
- Gráfico 50. Distribución porcentual la realización de audiometrías en la población de 5 a 13 años según provincias de Argentina. Año 2013.
- Gráfico 51. Distribución porcentual de los hallazgos odontológicos en la población de 5 a 13 años según regiones de Argentina. Año 2013.
- Gráfico 52. Distribución porcentual de la patología de piezas temporarias en la población de 5 a 13 años según provincias de Argentina. Año 2013.
- Gráfico 53. Distribución porcentual de la patología de piezas definitivas en la población de 5 a 13 años según provincias de Argentina. Año 2013.
- Gráfico 54. Distribución porcentual de Maloclusión en la población de 5 a 13 años según provincias de Argentina. Año 2013.
- Gráfico 55. Distribución porcentual de los hallazgos odontológicos según sexo y grupos de edad. Total país. Año 2013.

#### Lista de tablas:

- Tabla 1. Indicadores demográficos y socioeconómicos. República Argentina. Año 2010
- Tabla 2. Indicadores demográficos y socioeconómicos seleccionados. Provincias y Regiones. República Argentina. Año 2010
- Tabla 3. Indicadores educativos seleccionados. República Argentina.
- Tabla 4. Indicadores de mortalidad en la población de 5 a 14 años. Argentina. Año 2013.
- Tabla 5. Indicadores de egresos hospitalarios según grupos de edad. Argentina. Año 2010.
- Tabla 6. Distribución porcentual de las causas de egreso hospitalario de establecimientos oficiales según grupos de edad. Argentina. Año 2013.
- Tabla 7. Distribución de los niños/as y adolescentes por provincias según grupos de edad y sexo. Argentina. Año 2013.
- Tabla 8. Distribución porcentual de los problemas de salud más frecuentes según sexo y grupos de edad. Total país. Año 2013.
- Tabla 9. Distribución de los problemas de salud más frecuentes según grupos de edad. Total país. Año 2013.
- Tabla 10. Distribución porcentual de los hallazgos clínicos más frecuentes según sexo y grupos de edad.

- Total país. Año 2013.

#### Lista de tablas en anexo:

- Tabla 1. Unidades Educativas de nivel primario según tipo de educación por Provincias. Argentina. Año 2013.
- Tabla 2. Unidades Educativas de educación común de nivel primario según sector de gestión por Provincias. Argentina. Año 2013.
- Tabla 3. Unidades Educativas de educación común de nivel primario según ámbito por Provincias. Argentina. Año 2013.
- Tabla 4. Defunciones, tasa de mortalidad por mil habitantes y mortalidad proporcional según sexo y grupos de edad. Argentina. Año 2013
- Tabla 5. Cantidad de muertes, mortalidad proporcional y tasa de mortalidad (cada 100.000 habitantes) de las principales causas de defunción en niños/as y adolescentes de 5 a 14 años según sexo. Argentina. Año 2013.
- Tabla 6. Egresos hospitalarios de establecimientos oficiales según sexo y grupos de edad. Argentina. Año 2013.
- Tabla 7. Egresos hospitalarios de establecimientos oficiales en niños/as y adolescentes de 5 a 14 años según diagnóstico de egreso por grupos de edad. Argentina. Año 2010.
- Tabla 8. Distribución de indicadores seleccionados según sexo y grupos de edad. Total País. Año 2013.
- Tabla 9. Distribución de indicadores seleccionados según sexo y grupos de edad. Región Noreste. Año 2013.
- Tabla 10. Distribución de indicadores seleccionados según sexo y grupos de edad. Región Noroeste. Año 2013.
- Tabla 11. Distribución de indicadores seleccionados según sexo y grupos de edad. Región Cuyo. Año 2013.
- Tabla 12. Distribución de indicadores seleccionados según sexo y grupos de edad. Región Patagonia. Año 2013
- Tabla 13. Distribución de indicadores seleccionados según sexo y grupos de edad. Región Centro. Año 2013
- Tabla 14. Distribución porcentual de los niños/as y adolescentes con hallazgos cardiovasculares por provincia según sexo y grupos de edad. Año 2013.
- Tabla 15. Distribución porcentual de los niños/as y adolescentes con hallazgos respiratorios por provincia según sexo y grupos de edad. Año 2013.
- Tabla 16. Distribución porcentual de los niños/as y adolescentes con hallazgos dermatológicos por provincia según sexo y grupos de edad. Año 2013.
- Tabla 17. Distribución porcentual de los niños y adolescentes con hallazgos genitourinarios por provincia según grupos de edad. Año 2013.
- Tabla 18. Distribución porcentual de las niñas y adolescentes con hallazgos genitourinarios por provincia según grupos de edad. Año 2013.
- Tabla 19. Distribución porcentual de los niños/as y adolescentes con hallazgos Osteoarticulares por provincia según sexo y grupos de edad. Año 2013.
- Tabla 20. Distribución porcentual de los niños/as y adolescentes con hallazgos abdominales por provincia según sexo y grupos de edad. Año 2013.
- Tabla 21. Distribución porcentual de los niños/as y adolescentes con hallazgos neurológicos por provincia según sexo y grupos de edad. Año 2013.
- Tabla 22. Distribución porcentual de los niños/as y adolescentes con sobrepeso por provincia según sexo y grupos de edad. Año 2013.

- Tabla 23. Distribución porcentual de los niños/as y adolescentes con obesidad por provincia según sexo y grupos de edad. Año 2013.
- Tabla 24. Distribución porcentual de los niños/as y adolescentes con sobrepeso y obesidad por provincia según sexo y grupos de edad. Año 2013.
- Tabla 25. Distribución porcentual de los niños/as y adolescentes con emaciación por provincia según sexo y grupos de edad. Año 2013.
- Tabla 26. Distribución porcentual de los niños/as y adolescentes con baja talla por provincia según sexo y grupos de edad. Año 2013.
- Tabla 27. Distribución porcentual de los niños/as y adolescentes con disminución de la agudeza visual por provincia según sexo y grupos de edad. Año 2013.
- Tabla 28. Distribución porcentual de los niños/as y adolescentes con estrabismo por provincia según sexo y grupos de edad. Año 2013.
- Tabla 29. Distribución porcentual de los niños/as y adolescentes con trastornos de la fonación por provincia según sexo y grupos de edad. Año 2013.
- Tabla 30. Distribución porcentual de los niños/as y adolescentes con hipoacusia por provincia según sexo y grupos de edad. Año 2013.
- Tabla 31. Distribución porcentual de los niños/as y adolescentes según evaluación con audiometría y detección de hipoacusia por Provincias de Argentina. Año 2013.
- Tabla 32. Distribución porcentual de los niños/as y adolescentes con patología de piezas temporarias por provincia según sexo y grupos de edad. Año 2013.
- Tabla 33. Distribución porcentual de los niños/as y adolescentes con patología de piezas definitivas por provincia según sexo y grupos de edad. Año 2013.
- Tabla 34. Distribución porcentual de los niños/as y adolescentes con maloclusión por provincia según sexo y grupos de edad. Año 2013.

## 9. Anexos

### Anexo 1: Planilla de datos utilizada en el año 2013



# PROSANE

## ACCIONES DE SALUD EN LA ESCUELA

Planilla N° \_\_\_\_\_

---

**PLANILLA DE DATOS**

Señores padres: a continuación les solicitamos la siguiente información que será de utilidad para los Equipos de Salud Escolar para realizar una evaluación completa de su hijo/a. Los datos brindados serán tratados con la máxima confidencialidad. En caso de no comprender alguno de los campos a completar aquí solicitado, les rogamos acercarse a la escuela que colaborará con usted.

Llevado por

Provincia: \_\_\_\_\_ Departamento: \_\_\_\_\_ Localidad: \_\_\_\_\_  
 Establecimiento Educativo: \_\_\_\_\_ Grado: \_\_\_\_\_ División: \_\_\_\_\_ Turno: \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido: \_\_\_\_\_ Sexo: M ó F DNI: \_\_\_\_\_  
 Fecha de nacimiento: / / Tel: \_\_\_\_\_ Tel. celular: \_\_\_\_\_  
 Domicilio: \_\_\_\_\_ Cobertura médica: SI /NO CUAL: \_\_\_\_\_  
 Nació Prematuro: SI /NO Peso de nacimiento: \_\_\_\_\_  
 SI /NO AUTORIZO A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD DEL PROSANE A REALIZARLE A  
 (nombre del niño)  
 UN EXAMEN CLÍNICO Y ODONTOLÓGICO COMPLETO Y A APLICAR LAS VACUNAS CORRESPONDIENTES  
 PARA COMPLETAR EL CALENDARIO DE VACUNACIÓN SI FUESE NECESARIO (recordar traer el último  
 comé de vacunación o fotocopia actualizada).  
 FIRMA DE LA MADRE, PADRE O ADULTO RESPONSABLE: \_\_\_\_\_  
 ACLARACIÓN: \_\_\_\_\_

Fecha del Examen (Mes/Año)

Padres, madre o tutor

**DESARROLLO ESCOLAR**  
 Zona: urbana/rural (marcar lo correcto) SOBRIEDAD: SI  NO  REPENTE: SI  NO

Docentes

**EXAMEN FÍSICO ODONTOLÓGICO**  

Peso Kg: <input type="text"/>	Talla cm: <input type="text"/>	ING: <input type="text"/>	TA max: <input type="text"/>	TA min: <input type="text"/>
Percentil Peso: <input type="text"/>	Percentil Talla: <input type="text"/>	Percentil IMC: <input type="text"/>	Percentil TA max: <input type="text"/>	Percentil TA min: <input type="text"/>

EXAMEN FÍSICO	NORMAL	PATOLÓGICO**	ESQUEMA DE VACUNACIÓN
PEL Y FANERA			Trabajo Común: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Completo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Reten aplicor (tipo y n° de dosis por vacuna): _____
CARDIOVASCULAR			
RESPIRATORIO			
GENITAL Y/O DESARROLLO PUBERAL			
ABDOMEN			
OSTEOARTICULAR			
NEUROLÓGICO			

\* En caso de patología detallar según codificación escrita al dorso.

OF TALMOLOGÍA	FONOAUDIOLÓGIA: Método diagnóstico utilizado
Estreñimiento: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Usa lentes: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Agudeza Visual izq: <input type="text"/> Agudeza Visual der: <input type="text"/>	Audiometría: <input type="checkbox"/> Teto <input type="checkbox"/> Diapason <input type="checkbox"/> Hipoacusia: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Trans. de fonación: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

RESPONSABLE: \_\_\_\_\_

**ODONTOLÓGIA**  
 Hilo de Perniciosos: SI  NO  C.E.O.D.   
 Maloclusión: SI  NO  C.P.O.D.   
 Flúor aplicado: SI  NO  C.   
 RESPONSABLE: \_\_\_\_\_

Marcar con AZUL, tratamiento a realizar. Rojo: tratamiento realizado

Dentición	Tratamiento																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> </table>	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> </table>	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
5	4	3	2	1	1	2	3	4	5																																																																								
5	4	3	2	1	1	2	3	4	5																																																																								
5	4	3	2	1	1	2	3	4	5																																																																								
5	4	3	2	1	1	2	3	4	5																																																																								
5	4	3	2	1	1	2	3	4	5																																																																								
5	4	3	2	1	1	2	3	4	5																																																																								
5	4	3	2	1	1	2	3	4	5																																																																								
5	4	3	2	1	1	2	3	4	5																																																																								

Equipo de salud

**DERIVACIONES**  

Pediatría <input type="checkbox"/>	Fonoesudología <input type="checkbox"/>	Nutrición <input type="checkbox"/>	Q.R.L. <input type="checkbox"/>	Trabajo social <input type="checkbox"/>	Agencia Sanitaria <input type="checkbox"/>
Odonatología <input type="checkbox"/>	Cardiología <input type="checkbox"/>	Quirúrgica <input type="checkbox"/>	Dermatología <input type="checkbox"/>	Psicología <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Oftalmología <input type="checkbox"/>	Truematología <input type="checkbox"/>	Urología <input type="checkbox"/>	Neurología <input type="checkbox"/>	Psicopedagogía <input type="checkbox"/>	

Resumen

### REFERENCIAS

#### \*Examen físico-odontológico:

\*Normal: Completar con Código 0

\*Patológicas: Completar según código de referencia que figura en el cuadro adjunto. En caso de presentar más de una patología del mismo aparato o sistema, expresar los códigos separados por guión.

Ejemplo: Si el niño presenta hidrocele (cod. 5), completar el campo patológico con el número 5.  
 Si el niño presenta hepatomegalia (cod. 1) y hernia (cod. 3) completar el campo patológico con el número 1-3.

\*Otras (cod. 6): Para otras patologías no especificadas en el cuadro adjunto, codificar con Cod. 6 para todos los aparatos y sistemas.

PEL Y FANERAS	CARDIOVASCULAR	RESPIRATORIO	ABDOMEN
Cod. 1 - Lesiones hipo o hiperpigmentadas	Cod. 1 - Soplo	Cod. 1 - Sibilancias	Cod. 1- Hepatomegalia
Cod. 2 - Eczema	Cod. 2 - Alteraciones del ritmo cardíaco	Cod. 2 - Asma	Cod. 2- Esplenomegalia
Cod. 3 - Impétigo	Cod. 3 - Alteraciones del pulso	Cod.3 - Infección respiratoria alta	Cod. 3- Hernias
Cod. 4 - Lesiones compatibles con maltrato		Cod. 4 - Infección respiratoria baja	Cod.4 Masa palpable

GENITOURINARIO / DESARROLLO PUBERAL (niños/nifios)	NEUROLOGICO	OSTEOARTICULAR
Cod. 1 - Alteraciones en estado de tunner	Cod. 1 - Retraso del desarrollo madurativo	Cod. 1 - Desviación de la columna
Cod. 2 - Infecciones urinarias e repetición	Cod. 2 - Convulsiones	Cod. 2 Patología del pie
Cod. 3 - Alteraciones y enfermedades de pene y uretra		Cod. 3 Alteraciones de la marcha
Cod. 4 - Ectopia testicular		
Cod. 5 - Hidrocele		

#### \*Oftalmología:

\*Agudeza visual: Se evalúa para cada ojo por separado. E: agudeza visual en ojo izquierdo (OI) de 10/10, se completa con 10, si es 9/10, se completa con 9. De igual modo se procede con el ojo derecho.

#### \*Observaciones:

Detallar todo dato relevante en relación al niño/a.

## Anexo 2: Provincias excluidas del análisis

### <sup>1</sup> Provincias excluidas del análisis por mala calidad del dato:

- **Prematurez:** las provincias de Formosa, La Rioja, Tucumán.
- **Bajo peso al nacer:** las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, San Juan, Santiago del Estero, Tucumán y Tierra del Fuego.
- **Repitencia:** las provincias de Jujuy, La Rioja, Neuquén, Salta y Santiago del Estero.
- **Sobreedad:** las provincias de Jujuy, La Rioja, Salta y Santiago del Estero.
- **Cobertura de salud:** las provincias de Formosa, La Rioja, Santa Fe, Santiago del Estero.
- **Agudeza visual:** las provincias de Misiones y Tierra del Fuego.
- **Estrabismo:** las provincias de Jujuy, Neuquén y Tierra del Fuego.
- **Hipoacusia:** las provincias de Formosa, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
- **Trastornos de la fonación:** las provincias de Formosa, Jujuy, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
- **Maloclusión:** las provincias de Jujuy, Santa Fe y Tierra del Fuego.
- **Índice C.E.O.D.:** las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Neuquén, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego.
- **Índice C.P.O.D.:** las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Jujuy, Neuquén, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego.
- **Peso y talla:** la provincia de La Rioja.
- **Percentilos de Tensión Arterial:** las provincias de Buenos Aires, La Rioja, Santa Fe y Santiago del Estero.

## Anexo 3: Datos de establecimientos educativos

Tabla 1. Unidades Educativas de nivel primario según tipo de educación por Provincias. Argentina. Año 2013.

Provincia	N° total unidades educativas de nivel primario	Unidades educativas de educación común		Unidades educativas de educación especial	
		N°	%	N°	%
Ciudad de Buenos Aires	954	883	92,6	71	7,4
Buenos Aires	6.389	5.918	92,6	471	7,4
Catamarca	471	454	96,4	17	3,6
Córdoba	2.236	2.144	95,9	92	4,1
Corrientes	984	928	94,3	56	5,7
Chaco	1.015	970	95,6	45	4,4
Chubut	261	237	90,8	24	9,2
Entre Ríos	1.369	1.301	95,0	68	5,0
Formosa	532	512	96,2	20	3,8
Jujuy	457	431	94,3	26	5,7
La Pampa	224	204	91,1	20	8,9
La Rioja	396	381	96,2	15	3,8
Mendoza	908	856	94,3	52	5,7
Misiones	1.030	970	94,2	60	5,8
Neuquén	392	355	90,6	37	9,4
Río Negro	412	387	93,9	25	6,1
Salta	862	826	95,8	36	4,2
San Juan	434	402	92,6	32	7,4
San Luis	391	353	90,3	38	9,7
Santa Cruz	130	111	85,4	19	14,6
Santa Fe	1.657	1.540	92,9	117	7,1
Santiago del Estero	1.284	1.253	97,6	31	2,4
Tucumán	792	757	95,6	35	4,4
Tierra del Fuego	57	54	94,7	3	5,3
<b>Total País</b>	<b>23.637</b>	<b>22.227</b>	<b>94,0</b>	<b>1.410</b>	<b>6,0</b>

Fuente: Relevamiento Anual 2013. DINIECE. Ministerio de Educación.

Tabla 2. Unidades Educativas de educación común de nivel primario según sector de gestión por Provincias. Argentina. Año 2013.

Provincia	N° total unidades educativas de nivel primario común	Unidades educativas de gestión estatal		Unidades educativas de gestión privada	
		N°	%	N°	%
Ciudad de Buenos Aires	883	459	52,0	424	48,0
Buenos Aires	5.918	4.297	72,6	1.621	27,4
Catamarca	454	433	95,4	21	4,6
Córdoba	2.144	1.858	86,7	286	13,3
Corrientes	928	864	93,1	64	6,9
Chaco	970	921	94,9	49	5,1
Chubut	237	208	87,8	29	12,2
Entre Ríos	1.301	1.136	87,3	165	12,7
Formosa	512	486	94,9	26	5,1
Jujuy	431	397	92,1	34	7,9
La Pampa	204	190	93,1	14	6,9
La Rioja	381	360	94,5	21	5,5
Mendoza	856	726	84,8	130	15,2
Misiones	970	866	89,3	104	10,7
Neuquén	355	318	89,6	37	10,4
Río Negro	387	325	84,0	62	16,0
Salta	826	741	89,7	85	10,3
San Juan	402	353	87,8	49	12,2
San Luis	353	316	89,5	37	10,5
Santa Cruz	111	88	79,3	23	20,7
Santa Fe	1.540	1.265	82,1	275	17,9
Santiago del Estero	1.253	1.195	95,4	58	4,6
Tucumán	757	633	83,6	124	16,4
Tierra del Fuego	54	42	77,8	12	22,2
<b>Total País</b>	<b>22.227</b>	<b>18.477</b>	<b>83,1</b>	<b>3.750</b>	<b>16,9</b>

Fuente: Relevamiento Anual 2013. DiNIECE. Ministerio de Educación.

Tabla 3. Unidades Educativas de educación común de nivel primario según ámbito por Provincias. Argentina. Año 2013.

Provincia	N° total unidades educativas de nivel primario común	Unidades educativas en ámbito urbano		Unidades educativas en ámbito rural	
		N°	%	N°	%
Ciudad de Buenos Aires	883	883	100,0	0	0,0
Buenos Aires	5.918	4.321	73,0	1.597	27,0
Catamarca	454	114	25,1	340	74,9
Córdoba	2.144	1.035	48,3	1.109	51,7
Corrientes	928	274	29,5	654	70,5
Chaco	970	309	31,9	661	68,1
Chubut	237	158	66,7	79	33,3
Entre Ríos	1.301	505	38,8	796	61,2
Formosa	512	170	33,2	342	66,8
Jujuy	431	188	43,6	243	56,4
La Pampa	204	107	52,5	97	47,5
La Rioja	381	115	30,2	266	69,8
Mendoza	856	526	61,4	330	38,6
Misiones	970	541	55,8	429	44,2
Neuquén	355	208	58,6	147	41,4
Río Negro	387	269	69,5	118	30,5
Salta	826	347	42,0	479	58,0
San Juan	402	202	50,2	200	49,8
San Luis	353	144	40,8	209	59,2
Santa Cruz	111	95	85,6	16	14,4
Santa Fe	1.540	878	57,0	662	43,0
Santiago del Estero	1.253	187	14,9	1.066	85,1
Tucumán	757	326	43,1	431	56,9
Tierra del Fuego	54	49	90,7	5	9,3
<b>Total País</b>	<b>22.227</b>	<b>11.951</b>	<b>53,8</b>	<b>10.276</b>	<b>46,2</b>

Fuente: Relevamiento Anual 2013. DiNIECE. Ministerio de Educación.

#### Anexo 4: Datos de Mortalidad y Egresos Hospitalarios

Tabla 4. Defunciones, tasa de mortalidad por mil habitantes y mortalidad proporcional según sexo y grupos de edad. Argentina. Año 2013

Grupos de edad	Ambos sexos			Varones			Mujeres		
	N° muertes	Tasa de Mortalidad	Mortalidad proporcional	N° muertes	Tasa de Mortalidad	Mortalidad proporcional	N° muertes	Tasa de Mortalidad	Mortalidad proporcional
menor 1 año	8.174	10,8	2,5	4.565	11,8	2,7	3.599	9,8	2,3
1 a 4	1.357	0,5	0,4	754	0,5	0,4	598	0,4	0,4
5 a 9	702	0,2	0,2	418	0,2	0,2	284	0,2	0,2
10 a 14	902	0,3	0,3	521	0,3	0,3	379	0,2	0,2
15 a 19	2.964	0,8	0,9	2.155	1,2	1,3	803	0,5	0,5
20 a 24	3.733	1,1	1,1	2.854	1,6	1,7	870	0,5	0,6
25 a 29	3.441	1,1	1,1	2.469	1,5	1,5	964	0,6	0,6
30 a 34	3.834	1,2	1,2	2.582	1,7	1,5	1.247	0,8	0,8
35 a 39	4.468	1,5	1,4	2.897	2,0	1,7	1.570	1,0	1,0
40 a 44	5.621	2,2	1,7	3.485	2,8	2,1	2.131	1,7	1,4
45 a 49	7.732	3,4	2,4	4.838	4,4	2,9	2.889	2,5	1,8
50 a 54	11.442	5,4	3,5	7.217	7,0	4,3	4.215	3,8	2,7
55 a 59	16.755	8,6	5,1	10.556	11,3	6,2	6.189	6,1	3,9
60 a 64	23.448	13,6	7,2	14.861	18,3	8,8	8.567	9,4	5,5
65 a 69	28.861	20,2	8,8	17.905	27,5	10,6	10.934	14,1	7,0
70 a 74	33.182	30,3	10,2	19.582	41,1	11,6	13.579	21,9	8,7
75 a 79	38.538	46,5	11,8	20.845	62,5	12,3	17.675	35,7	11,3
80 a 84	47.155	81,3	14,5	22.079	105,4	13,1	25.046	67,6	16,0
85 y mas	83.185	169,6	25,5	28.166	195,5	16,7	54.958	158,7	35,1
sin especificar	703		0,2	360		0,2	191		0,1
<b>Total</b>	<b>326.197</b>	<b>7,7</b>	<b>100,0</b>	<b>169.109</b>	<b>8,2</b>	<b>100,0</b>	<b>156.688</b>	<b>7,3</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS).

Tabla 5. Cantidad de muertes, mortalidad proporcional y tasa de mortalidad (cada 100.000 habitantes) de las principales causas de defunción en niños/as y adolescentes de 5 a 14 años según sexo. Argentina. Año 2013

Principales causas de Defunción	Ambos Sexos			Varones			Mujeres		
	N° de muertes	Mortalidad Proporcional (%)	Tasa de mortalidad (por cien mil)	N° de muertes	Mortalidad Proporcional (%)	Tasa de mortalidad (por cien mil)	N° de muertes	Mortalidad Proporcional (%)	Tasa de mortalidad (por cien mil)
Todas las causas	1.604		22,8	939		26,1	663		19,3
Todas las causas bien definidas	1.536	100	21,8	896	100	24,9	638	100	18,6
Accidentes, inclusive secuelas	421	27,4	6,0	268	29,9	7,4	152	23,8	4,4
Tumores malignos	264	17,2	3,8	150	16,7	4,2	114	17,9	3,3
Malformaciones congénitas	105	6,8	1,5	57	6,4	1,6	48	7,5	1,4
Eventos de intención no determinada, incl. secuelas	74	4,8	1,1	50	5,6	1,4	24	3,8	0,7
Suicidios, inclusive secuelas	65	4,2	0,9	33	3,7	0,9	32	5,0	0,9
Neumonía e influenza	55	3,6	0,8	28	3,1	0,8	26	4,1	0,8

Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS).

Tabla 6. Egresos hospitalarios de establecimientos oficiales según sexo y grupos de edad. Argentina. Año 2013

Grupos de edad	Ambos sexos		Varones		Mujeres		Sin especificar
	N° Egresos	%	N° Egresos	%	N° Egresos	%	N° Egresos
Menores de 1 año	178.343	8,7	97.219	12,2	80.899	6,5	225
1 a 4	126.865	6,2	69.604	8,8	57.188	4,6	73
5 a 14	147.551	7,2	80.038	10,1	67.399	5,4	114
15 a 24	415.261	20,3	85.168	10,7	329.989	26,3	104
25 a 34	337.019	16,4	73.788	9,3	263.131	21,0	100
35 a 44	195.502	9,5	63.053	7,9	132.340	10,6	109
45 a 54	159.598	7,8	75.652	9,5	83.847	6,7	99
55 a 64	172.747	8,4	96.254	12,1	76.411	6,1	82
65 a 74	126.966	6,2	70.700	8,9	56.182	4,5	84
75 y más	150.140	7,3	66.330	8,3	83.724	6,7	86
Sin especificar	39.958	1,9	17.148	2,2	22.750	1,8	60
<b>Total</b>	<b>2.049.950</b>	<b>100,0</b>	<b>794.954</b>	<b>100,0</b>	<b>1.253.860</b>	<b>100,0</b>	<b>1.136</b>

Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS).

Tabla 7. Egresos hospitalarios de establecimientos oficiales en niños/as y adolescentes de 5 a 14 años según diagnóstico de egreso por grupos de edad. Argentina. Año 2010.

Diagnóstico de Egreso por Capítulos de CIE-10 <sup>1</sup>	5 a 9 años		10 a 14 años		5 a 14 años	
	N° Egresos	%	N° Egresos	%	N° Egresos	%
I. Enfermedades infecciosas y parasitarias	6.538	8,8	4.360	6,0	4.366	7,4
II. Tumores	1.997	2,7	2.044	2,8	2.047	2,7
III. Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	1.300	1,7	857	1,2	858	1,5
VI. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1.838	2,5	1.893	2,6	1.896	2,5
V. Trastornos mentales y del comportamiento	245	0,3	1.231	1,7	1.233	1,0
VI. Enfermedades del sistema nervioso central	1.490	2,0	1.456	2,0	1.458	2,0
VII. Enfermedades de los ojos y sus anexos	540	0,7	448	0,6	449	0,7
VIII. Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	350	0,5	377	0,5	378	0,5
IX. Enfermedades del sistema circulatorio	516	0,7	794	1,1	795	0,9
X. Enfermedades del sistema respiratorio	15.806	21,2	8.165	11,2	8.176	16,2
XI. Enfermedades del sistema digestivo	8.150	11,0	10.172	13,9	10.186	12,4
XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2.785	3,7	2.559	3,5	2.562	3,6
XIII. Enfermedades del sistema osteoarticular y del tejido conjuntivo	1.194	1,6	1.763	2,4	1.765	2,0
XIV. Enfermedades del sistema genitourinario	3.054	4,1	3.315	4,5	3.320	4,3
XV. Embarazo, parto y puerperio	3	0,0	4.409	6,0	4.415	3,0
XVI. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2.022	2,7	1.299	1,8	1.301	2,3
XVIII. Síntomas, signos y hallazgos clínicos y de laboratorio	9.677	13,0	10.279	14,1	10.293	13,5
XX. Causas externas	15.108	20,3	15.892	21,7	15.914	21,0
XXI. Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios	1.797	2,4	1.827	2,5	1.829	2,5
<b>Total</b>	<b>74.410</b>	<b>100,0</b>	<b>73.140</b>	<b>100,0</b>	<b>73.240</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS).

Anexo 5: Tablas de datos a nivel regional y provincial

TOTAL PAÍS

Tabla 8. Distribución de indicadores seleccionados según sexo y grupos de edad. Total País. Año 2013

Indicador	Mujeres 5 a 9 años	Varones 5 a 9 años	Mujeres 10 a 13 años	Varones 10 a 13 años	Total Mujeres	Total Varones	Total 5 a 9 años	Total 10 a 13 años	Niñas/os 5 a 13 años	IC 95%		% Sin datos	N° prov. Excluidas <sup>1</sup>
										Límite Inferior	Límite Superior		
<b>Población</b>	47.763	47.449	41.133	37.946	88.896	85.395	95.214	79.080	174.294				
% Prematurez	6,0	5,9	5,8	5,6	5,9	5,8	6,0	5,7	5,9	5,7	6,0	5,8	3
% Bajo peso al nacer	6,9	5,8	6,8	5,9	6,8	5,8	6,3	6,4	6,3	6,2	6,5	10,2	8
% Repitencia	2,4	3,1	7,5	9,9	4,8	6,1	2,8	8,6	5,4	5,3	5,6	6,2	5
% Sobreedad	3,4	3,9	8,1	10,0	5,6	6,6	3,6	9,0	6,1	5,9	6,2	6,7	4
% Cobertura únicamente estatal	67,1	66,3	66,4	64,9	66,8	65,7	66,7	65,7	66,2	66,0	66,5	4,8	4
% Carnet completo de vacunación	65,0	64,6	58,4	59,2	61,9	62,2	64,8	58,8	62,1	61,8	62,3	2,3	0
% Hallazgos Cardiovasculares	2,7	3,2	2,1	2,6	2,4	2,9	2,9	2,3	2,7	2,6	2,7	0,6	0
% Hallazgos Respiratorios	2,7	3,0	1,7	2,1	2,3	2,6	2,8	1,9	2,4	2,4	2,5	0,5	0
% Hallazgos Dermatológicos	3,7	3,7	3,2	3,2	3,4	3,5	3,7	3,2	3,5	3,4	3,6	0,6	0
% Hallazgos Genitourinarios VARONES		2,8		2,5		2,7			2,7	2,6	2,8	0,7	0
% Hallazgos Genitourinarios MUJERES	0,6		1,2		0,8				0,8	0,8	0,9	0,7	0
% Hallazgos Abdominales	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,6	0
% Hallazgos Osteoarticulares	7,2	8,0	7,9	7,5	7,5	7,8	7,6	7,7	7,7	7,5	7,8	0,8	0
% Hallazgos Neurológicos	0,7	0,9	0,6	0,9	0,6	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8	0,7	0
% Disminución Agudeza Visual	11,2	10,3	9,1	7,9	10,2	9,3	10,8	8,5	9,8	9,6	9,9	5,0	2
% Estrabismo	1,2	1,1	1,0	0,9	1,1	1,0	1,1	1,0	1,1	1,0	1,1	4,5	3
% Hipoacusia	1,0	1,1	1,1	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	6,3	3
% Trastornos de la Fonación	4,8	6,4	1,1	1,4	3,1	4,2	5,6	1,2	3,7	3,6	3,8	5,2	4
% Maloclusión	14,2	13,7	22,3	22,3	18,0	17,5	13,9	22,3	17,8	17,6	18,0	3,5	3
% Patología Piezas Temporarias	55,3	56,4	19,9	23,0	38,0	40,9	55,8	21,4	39,4	39,0	39,8	0,6	8
% Patología Piezas Definitivas	15,2	14,0	48,6	45,3	30,8	27,9	14,6	47,0	29,4	29,1	29,7	2,3	7
% Emaciación	1,8	1,9	2,4	2,1	2,1	2,0	1,8	2,3	2,0	2,0	2,1	0,7	1
% Sobrepeso	19,5	19,6	24,4	22,9	21,8	21,1	19,6	23,7	21,5	21,3	21,7	0,7	1
% Obesidad	13,3	16,6	13,5	19,7	13,4	18,0	14,9	16,5	15,6	15,5	15,8	0,7	1
% Sobrepeso + Obesidad	32,8	36,2	37,8	42,6	35,2	39,1	34,5	40,1	37,1	36,8	37,3	0,7	1
% Baja Talla	2,4	3,9	2,2	1,8	2,3	2,9	3,2	2,0	2,6	2,5	2,7	0,7	1
% TA igual o mayor al percentilo 95	4,1	4,2	5,9	6,4	5,0	5,2	4,1	6,1	5,1	5,0	5,2	4,9	4

Fuente: PROSANE. Nota: en el anexo 2 se detallan las provincias excluidas del análisis

REGIÓN NORESTE (NEA)

Tabla 9. Distribución de indicadores seleccionados según sexo y grupos de edad. Región Noreste. Año 2013

Indicador	Mujeres 5 a 9 años	Varones 5 a 9 años	Mujeres 10 a 13 años	Varones 10 a 13 años	Total Mujeres	Total Varones	Total 5 a 9 años	Total 10 a 13 años	Niñas/os 5 a 13 años	IC 95%		% Sin datos	N° prov. Excluidas <sup>1</sup>
										Límite Inferior	Límite Superior		
<b>Población</b>	5.950	6.068	5.666	5.341	11.616	11.409	12.018	11.007	23.025				
% Prematurez	5,8	6,7	6,0	5,1	5,9	6,0	6,3	5,6	6,0	5,6	6,3	9,2	1
% Bajo peso al nacer	5,9	5,2	6,4	5,0	6,2	5,1	5,5	5,7	5,621	5,2	6,0	11,8	2
% Repitencia	4,5	6,1	14,0	18,1	9,1	11,7	5,3	16,0	10,4	10,0	10,8	6,9	0
% Sobreedad	4,9	5,6	13,9	17,2	9,3	11,0	5,3	15,5	10,1	9,7	10,5	6,8	0
% Cobertura únicamente estatal	91,3	89,0	91,0	90,6	91,2	89,7	90,2	90,8	90,5	90,0	90,9	7,0	1
% Carnet completo de vacunación	67,7	68,4	66,5	60,9	67,1	64,9	68,0	63,8	66,0	65,4	66,6	2,7	0
% Hallazgos Cardiovasculares	1,0	0,8	0,4	0,9	0,7	0,9	0,9	0,6	0,8	0,7	0,9	0,0	0
% Hallazgos Respiratorios	2,0	2,2	1,0	1,5	1,5	1,8	2,1	1,2	1,7	1,5	1,8	0,0	0
% Hallazgos Dermatológicos	1,2	1,3	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	0,8	1,0	0,9	1,1	0,0	0
% Hallazgos Genitourinarios VARONES		0,3		0,1		0,2			0,2	0,1	0,3	0,0	0
% Hallazgos Genitourinarios MUJERES	0,1		0,1		0,1				0,1	0,0	0,1	0,0	0
% Hallazgos Abdominales	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0
% Hallazgos Osteoarticulares	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5	0,0	0
% Hallazgos Neurológicos	0,2	0,4	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,1	0,2	0,2	0,3	0,0	0
% Disminución Agudeza Visual	1,6	1,9	2,4	2,1	2,0	2,0	1,7	2,3	2,0	1,7	2,3	10,1	1
% Estrabismo	1,6	1,5	1,9	1,3	1,7	1,4	1,6	1,6	1,6	1,4	1,7	5,4	0
% Hipoacusia	1,0	0,7	1,4	1,4	1,2	1,0	0,8	1,4	1,1	0,9	1,3	0,3	1
% Trastornos de la Fonación	3,4	6,4	1,0	1,5	2,3	4,2	4,9	1,3	3,2	2,9	3,5	0,3	1
% Maloclusión	11,6	12,2	17,3	19,4	14,4	15,6	11,9	18,3	15,0	14,5	15,4	5,8	0
% Patología Piezas Temporarias	51,4	54,1	19,8	22,8	36,0	39,5	52,8	21,2	37,7	37,1	38,3	0,9	0
% Patología Piezas Definitivas	15,6	14,6	45,9	42,5	30,4	27,7	15,1	44,3	29,0	28,5	29,6	0,2	0
% Emaciación	2,4	2,3	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,4	2,4	2,2	2,6	0,7	0
% Sobrepeso	17,5	18,0	21,1	19,8	19,3	18,9	17,7	20,5	19,1	18,6	19,6	0,7	0
% Obesidad	8,8	12,6	9,4	14,0	9,1	13,2	10,7	11,6	11,2	10,7	11,6	0,7	0
% Sobrepeso + Obesidad	26,3	30,6	30,6	33,8	28,4	32,1	28,4	32,2	30,2	29,6	30,8	0,7	0
% Baja Talla	5,1	7,0	3,0	2,5	4,1	4,8	6,1	2,8	4,5	4,2	4,7	0,7	0
% TA igual o mayor al percentilo 95	3,2	3,8	4,6	4,3	3,9	4,0	3,5	4,4	3,9	3,7	4,2	8,3	0

Fuente: PROSANE

Nota: en el anexo 2 se detallan las provincias excluidas del análisis

**REGIÓN NOROESTE (NOA)**

Tabla 10. Distribución de indicadores seleccionados según sexo y grupos de edad. Región Noroeste. Año 2013

Indicador	Mujeres 5 a 9 años	Varones 5 a 9 años	Mujeres 10 a 13 años	Varones 10 a 13 años	Total Mujeres	Total Varones	Total 5 a 9 años	Total 10 a 13 años	Niñas/ os 5 a 13 años	IC 95%		% Sin datos	N° prov. Excluidas <sup>1</sup>
										Límite Inferior	Límite Superior		
<b>Población</b>	6.745	6.806	6.757	6.347	13.502	13.153	13.551	13.104					
% Prematurez	7,9	7,7	7,0	7,3	7,5	7,5	7,8	7,1	7,5	7,1	7,8	10,8	1
% Bajo peso al nacer	6,9	5,2	5,9	5,4	6,4	5,3	6,0	5,7	5,9	5,5	6,2	3,3	2
% Repitencia	0,8	1,1	7,8	10,0	4,2	5,1	0,9	8,8	4,6	3,8	5,4	3,1	3
% Sobreedad	1,3	1,0	5,4	7,1	3,3	3,7	1,1	6,1	3,5	2,8	4,1	3,3	3
% Cobertura únicamente estatal	58,4	56,4	55,1	53,8	56,7	55,2	57,4	54,5	56,0	55,3	56,6	7,2	1
% Carnet completo de vacunación	76,4	75,4	71,4	69,6	73,9	72,6	75,9	70,5	73,3	72,7	73,8	4,4	0
% Hallazgos Cardiovasculares	3,0	3,8	2,5	3,0	2,7	3,4	3,4	2,7	3,1	2,8	3,3	0,0	0
% Hallazgos Respiratorios	3,9	4,4	2,5	2,6	3,2	3,5	4,2	2,5	3,4	3,1	3,6	0,0	0
% Hallazgos Dermatológicos	5,5	5,8	5,3	5,2	5,4	5,5	5,6	5,2	5,4	5,2	5,7	0,0	0
% Hallazgos Genitourinarios VARONES		6,4		4,9		5,7			5,7	5,3	6,1	0,0	0
% Hallazgos Genitourinarios MUJERES	1,8		2,4		2,1				2,1	1,9	2,4	0,0	0
% Hallazgos Abdominales	0,5	0,7	0,7	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,7	0,0	0
% Hallazgos Osteoarticulares	7,4	10,1	7,4	8,0	7,4	9,1	8,8	7,7	8,2	7,9	8,6	0,0	0
% Hallazgos Neurológicos	0,7	0,9	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,7	0,8	0,7	0,9	0,0	0
% Disminución Agudeza Visual	23,0	21,8	17,4	15,2	20,2	18,6	22,4	16,3	19,4	18,9	19,9	2,7	0
% Estrabismo	2,0	1,9	1,1	1,4	1,6	1,7	2,0	1,2	1,6	1,4	1,8	10,4	1
% Hipoacusia	1,5	2,0	1,5	1,4	1,5	1,7	1,7	1,4	1,6	1,4	1,7	12,5	1
% Trastornos de la Fonación	8,0	9,3	1,9	3,3	4,9	6,5	8,6	2,5	5,7	5,2	6,2	11,0	2
% Maloclusión	22,0	21,6	31,9	31,7	27,0	26,2	21,8	31,8	26,6	25,8	27,3	9,8	1
% Patología Piezas Temporarias	53,3	53,9	16,0	17,9	34,8	37,5	53,6	16,9	36,1	35,2	36,9	0,4	1
% Patología Piezas Definitivas	13,1	11,2	51,1	47,0	32,0	27,5	12,2	49,2	29,9	29,1	30,6	0,5	1
% Emaciación	1,6	1,6	2,8	1,9	2,2	1,7	1,6	2,3	2,0	1,8	2,1	0,4	0
% Sobrepeso	18,8	19,4	24,3	22,5	21,6	20,9	19,1	23,4	21,2	20,7	21,7	0,4	0
% Obesidad	12,9	17,1	11,7	21,0	12,3	19,0	15,0	16,2	15,6	15,2	16,1	0,4	0
% Sobrepeso + Obesidad	31,8	36,5	36,0	43,5	33,9	39,9	34,2	39,6	36,9	36,3	37,4	0,4	0
% Baja Talla	1,6	2,2	1,7	1,4	1,7	1,8	1,9	1,6	1,8	1,6	1,9	0,4	0
% TA igual o mayor al percentilo 95	9,7	9,6	10,8	12,9	10,2	11,2	9,7	11,8	10,7	10,3	11,1	11,5	1

Fuente: PROSANE

Nota: en el anexo 2 se detallan las provincias excluidas del análisis

**REGIÓN CUYO**

Tabla 11. Distribución de indicadores seleccionados según sexo y grupos de edad. Región Cuyo. Año 2013

Indicador	Mujeres 5 a 9 años	Varones 5 a 9 años	Mujeres 10 a 13 años	Varones 10 a 13 años	Total Mujeres	Total Varones	Total 5 a 9 años	Total 10 a 13 años	Niñas/ os 5 a 13 años	IC 95%		% Sin datos	N° prov. Excluidas <sup>1</sup>
										Límite Inferior	Límite Superior		
<b>Población</b>	9.108	9.165	6.663	6.053	15.771	15.218	18.273	12.716	30.989				
% Prematurez	6,0	6,2	6,3	5,9	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	5,8	6,4	5,4	1
% Bajo peso al nacer	6,0	5,9	6,5	6,1	6,2	6,0	6,0	6,3	6,1	5,7	6,6	14,2	2
% Repitencia	3,6	4,6	10,2	13,3	6,6	8,4	4,1	11,7	7,5	7,1	7,9	1,4	1
% Sobreedad	3,9	4,6	9,6	12,4	6,5	8,0	4,2	10,9	7,2	6,9	7,6	1,3	1
% Cobertura únicamente estatal	61,9	61,7	61,2	58,3	61,6	60,2	61,8	59,8	60,9	58,6	60,0	5,3	1
% Carnet completo de vacunación	41,5	40,9	39,1	38,9	40,5	40,1	41,2	39,0	40,3	39,7	40,8	0,3	0
% Hallazgos Cardiovasculares	5,2	5,8	4,2	5,1	4,7	5,5	5,5	4,6	5,1	4,9	5,4	0,0	0
% Hallazgos Respiratorios	2,8	2,8	2,0	2,4	2,5	2,6	2,8	2,2	2,5	2,4	2,7	0,0	0
% Hallazgos Dermatológicos	7,9	7,6	6,6	6,7	7,4	7,3	7,8	6,7	7,3	7,0	7,6	0,0	0
% Hallazgos Genitourinarios VARONES		1,3		2,3		1,7			1,7	1,5	1,9	0,0	0
% Hallazgos Genitourinarios MUJERES	0,3		1,5		0,8				0,8	0,7	1,0	0,0	0
% Hallazgos Abdominales	0,5	0,4	0,3	0,2	0,4	0,4	0,5	0,3	0,4	0,3	0,5	0,0	0
% Hallazgos Osteoarticulares	10,4	10,4	10,3	9,4	10,4	10,0	10,4	9,9	10,2	9,9	10,5	0,8	0
% Hallazgos Neurológicos	0,5	0,6	0,5	1,1	0,5	0,8	0,6	0,8	0,7	0,6	0,7	0,7	0
% Disminución Agudeza Visual	12,6	11,8	10,7	8,5	11,8	10,5	12,2	9,7	11,2	10,8	11,5	4,0	0
% Estrabismo	1,0	1,0	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	0,7	0,9	0,8	1,0	1,0	0
% Hipoacusia	0,9	1,0	1,1	0,9	0,9	1,0	0,9	1,0	1,0	0,8	1,1	1,9	0
% Trastornos de la Fonación	2,2	4,0	1,2	1,2	1,8	2,9	3,1	1,2	2,3	2,1	2,5	1,7	0
% Maloclusión	16,4	16,5	22,4	22,1	19,0	18,7	16,5	22,3	18,8	18,4	19,3	1,8	0
% Patología Piezas Temporarias	65,0	64,5	19,5	22,9	43,6	46,2	64,8	21,1	44,9	44,1	45,7	0,1	2
% Patología Piezas Definitivas	18,8	17,9	49,7	46,1	31,7	29,0	18,4	48,0	30,4	29,8	30,9	5,9	1
% Emaciación	1,8	1,8	2,4	2,2	2,1	2,0	1,8	2,3	2,0	1,8	2,2	0,3	1
% Sobrepeso	17,9	19,0	23,7	20,6	20,6	19,7	18,5	22,2	20,2	19,6	20,7	0,3	1
% Obesidad	12,7	15,2	14,5	18,8	13,5	16,8	13,9	16,5	15,1	14,6	15,6	0,3	1
% Sobrepeso + Obesidad	30,6	34,2	38,2	39,4	34,1	36,5	32,4	38,8	35,3	29,4	30,7	0,3	1
% Baja Talla	1,0	1,7	1,8	1,5	1,4	1,6	1,4	1,6	1,5	1,3	1,7	0,3	1
% TA igual o mayor al percentilo 95	3,2	3,3	8,4	7,7	5,6	5,2	3,2	8,1	5,4	5,1	5,7	0,1	1

Fuente: PROSANE

Nota: en el anexo 2 se detallan las provincias excluidas del análisis

**REGIÓN PATAGONIA**

Tabla 12. Distribución de indicadores seleccionados según sexo y grupos de edad. Región Patagonia. Año 2013

Indicador	Mujeres 5 a 9 años	Varones 5 a 9 años	Mujeres 10 a 13 años	Varones 10 a 13 años	Total Mujeres	Total Varones	Total 5 a 9 años	Total 10 a 13 años	Niñas/ os 5 a 13 años	IC 95%		% Sin datos	N° prov. Excluidas <sup>1</sup>
										Límite Inferior	Límite Superior		
<b>Población</b>	3.356	3.452	3.232	3.147	6.588	6.599	6.808	6.379	13.187				
% Prematurez	4,8	3,9	4,8	3,8	4,8	3,9	4,4	4,3	4,3	4,0	4,7	2,6	0
% Bajo peso al nacer	6,3	3,9	6,0	3,6	6,2	3,8	5,1	4,9	5,0	4,6	5,4	2,7	1
% Repitencia	0,2	0,3	3,7	5,1	1,9	2,6	0,2	4,4	2,3	2,0	2,6	2,6	1
% Sobreedad	0,7	0,8	4,5	5,9	2,6	3,2	0,7	5,2	2,9	2,6	3,2	2,7	0
% Cobertura únicamente estatal	55,8	54,6	55,6	51,2	55,7	53,0	55,2	53,5	54,4	53,5	55,2	2,8	0
% Carnet completo de vacunación	92,9	91,9	81,7	81,8	87,4	87,1	92,4	81,8	87,3	86,7	87,8	1,5	0
% Hallazgos Cardiovasculares	3,5	3,7	2,4	3,0	3,0	3,4	3,6	2,7	3,2	2,8	3,5	6,0	0
% Hallazgos Respiratorios	3,5	3,4	1,5	1,9	2,5	2,7	3,4	1,7	2,6	2,3	2,9	6,0	0
% Hallazgos Dermatológicos	2,9	2,6	2,0	1,8	2,4	2,2	2,7	1,9	2,3	2,1	2,6	6,0	0
% Hallazgos Genitourinarios VARONES		5,3		3,4		4,4			4,4	3,9	4,9	8,4	0
% Hallazgos Genitourinarios MUJERES	1,2		1,9		1,6				1,6	1,3	1,9	8,4	0
% Hallazgos Abdominales	0,7	0,3	0,2	0,3	0,4	0,3	0,5	0,2	0,3	0,2	0,4	6,1	0
% Hallazgos Osteoarticulares	11,2	11,2	10,1	10,0	10,6	10,7	11,2	10,1	10,7	10,1	11,8	6,0	0
% Hallazgos Neurológicos	1,1	1,0	0,4	0,6	0,8	0,8	1,1	0,5	0,8	0,6	0,9	6,1	0
% Disminución Agudeza Visual	6,8	6,8	5,5	4,3	6,2	5,6	6,8	4,9	5,9	5,4	6,4	0,9	1
% Estrabismo	0,5	0,3	0,7	0,5	0,6	0,4	0,4	0,6	0,5	0,3	0,7	3,3	2
% Hipoacusia	0,4	0,7	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6	0,1	0,4	0,2	0,5	7,2	1
% Trastornos de la Fonación	1,5	3,2	0,4	0,2	1,0	1,8	2,4	0,3	1,4	1,1	1,6	7,4	1
% Maloclusión	13,5	13,1	22,5	22,0	18,0	17,3	13,3	22,3	17,6	16,9	18,4	1,6	1
% Patología Piezas Temporarias	44,5	43,7	21,0	24,1	32,7	34,2	44,1	22,5	33,5	32,4	34,5	0,1	2
% Patología Piezas Definitivas	4,2	3,9	34,7	33,9	19,4	18,4	4,0	34,3	18,9	17,9	19,7	0,1	2
% Emaciación	1,2	1,4	1,9	1,5	1,5	1,5	1,3	1,7	1,5	1,3	1,7	0,8	0
% Sobrepeso	21,1	20,8	26,7	25,4	23,9	23,0	21,0	26,1	23,4	22,7	24,2	0,8	0
% Obesidad	16,2	19,8	16,8	25,6	16,5	22,6	18,0	21,2	19,6	18,9	20,2	0,8	0
% Sobrepeso + Obesidad	37,4	40,6	43,6	51,1	40,4	45,6	39,0	47,3	43,0	42,2	43,9	0,8	0
% Baja Talla	1,4	1,5	1,0	0,8	1,2	1,2	1,4	0,9	1,2	1,0	1,4	0,6	0
% TA igual o mayor al percentilo 95	4,3	4,6	6,3	8,4	5,3	6,4	4,4	7,3	5,8	5,4	6,2	2,2	0

Fuente: PROSANE

Nota: en el anexo 2 se detallan las provincias excluidas del análisis

**REGIÓN CENTRO**

Tabla 13. Distribución de indicadores seleccionados según sexo y grupos de edad. Región Centro. Año 2013

Indicador	Mujeres 5 a 9 años	Varones 5 a 9 años	Mujeres 10 a 13 años	Varones 10 a 13 años	Total Mujeres	Total Varones	Total 5 a 9 años	Total 10 a 13 años	Niñas/ os 5 a 13 años	IC 95%		% Sin datos	N° prov. Excluidas <sup>1</sup>
										Límite Inferior	Límite Superior		
<b>Población</b>	22.604	21.958	18.815	17.058	41.419	39.016	44.564	35.874	80.438				
% Prematurez	5,7	5,5	5,5	5,3	5,6	5,4	5,6	5,4	5,5	5,4	5,7	4,2	0
% Bajo peso al nacer	7,3	6,3	7,3	6,7	7,3	6,5	6,8	7,0	6,9	6,7	7,1	12,5	1
% Repitencia	2,0	2,3	5,4	7,2	3,5	4,4	2,1	6,2	4,0	3,8	4,1	7,8	0
% Sobreedad	3,4	3,8	6,6	8,0	4,9	5,6	3,6	7,3	5,2	5,1	5,4	8,7	0
% Cobertura únicamente estatal	68,0	67,8	68,4	67,7	68,2	67,8	67,9	68,0	68,0	67,6	68,3	3,9	1
% Carnet completo de vacunación	66,2	65,9	54,0	57,8	60,6	62,4	66,0	55,8	61,5	61,1	61,8	2,3	0
% Hallazgos Cardiovasculares	1,9	2,5	1,7	2,0	1,8	2,3	2,2	1,8	2,0	1,9	2,1	0,2	0
% Hallazgos Respiratorios	2,4	2,7	1,7	2,1	2,1	2,4	2,6	1,9	2,3	2,2	2,4	0,1	0
% Hallazgos Dermatológicos	2,2	2,3	2,1	2,3	2,2	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,3	0,2	0
% Hallazgos Genitourinarios VARONES		2,6		2,3		2,5			2,5	2,3	2,6	0,1	0
% Hallazgos Genitourinarios MUJERES	0,3		0,8		0,5				0,5	0,5	0,6	0,1	0
% Hallazgos Abdominales	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0
% Hallazgos Osteoarticulares	7,1	7,9	9,1	8,4	8,0	8,1	7,5	8,8	8,1	7,9	8,2	0,4	0
% Hallazgos Neurológicos	0,8	1,1	0,8	1,2	0,8	1,2	0,9	1,0	1,0	0,9	1,0	0,2	0
% Disminución Agudeza Visual	8,6	7,5	6,8	6,2	7,8	6,9	8,1	6,5	7,4	7,2	7,6	6,0	0
% Estrabismo	1,1	0,9	0,9	0,8	1,0	0,9	1,0	0,8	0,9	0,9	1,0	4,7	0
% Hipoacusia	0,9	1,0	1,0	0,7	1,0	0,9	1,0	0,9	0,9	0,8	1,0	7,6	0
% Trastornos de la Fonación	6,3	7,4	1,1	1,4	3,9	4,8	6,8	1,2	4,3	4,2	4,5	6,7	0
% Maloclusión	12,5	11,3	22,0	21,6	17,1	16,1	11,9	21,8	16,6	16,3	16,9	2,7	1
% Patología Piezas Temporarias	63,7	64,9	27,2	30,6	45,3	48,1	64,3	28,9	46,7	45,5	47,8	2,0	3
% Patología Piezas Definitivas	13,6	11,9	63,3	59,5	38,7	35,2	12,7	61,4	37,0	35,9	38,1	2,4	3
% Emaciación	1,8	2,0	2,4	2,1	2,1	2,0	1,9	2,3	2,1	2,0	2,2	0,8	0
% Sobrepeso	20,4	20,1	25,1	24,1	22,5	21,8	20,2	24,6	22,2	21,9	22,5	0,8	0
% Obesidad	14,2	17,3	14,5	20,1	14,3	18,6	15,8	17,2	16,4	16,1	16,6	0,8	0
% Sobrepeso + Obesidad	34,6	37,4	39,6	44,2	36,9	40,4	36,0	41,8	38,6	38,2	38,9	0,8	0
% Baja Talla	2,4	4,5	2,4	1,9	2,4	3,4	3,4	2,2	2,9	2,8	3,0	0,9	0
% TA igual o mayor al percentilo 95	0,6	0,6	0,8	1,0	0,7	0,8	0,6	0,9	0,8	0,7	0,9	1,4	2

Fuente: PROSANE

Nota: en el anexo 2 se detallan las provincias excluidas del análisis

## HALLAZGOS CARDIOVASCULARES

Tabla 14. Distribución porcentual de los niños/as y adolescentes con hallazgos cardiovasculares por provincia según sexo y grupos de edad. Año 2013

Provincia	Mujeres 5 a 9 años	Varones 5 a 9 años	Mujeres 10 a 13 años	Varones 10 a 13 años	Total Mujeres	Total Varones	Total 5 a 9 años	Total 10 a 13 años	Niñas/os de 5 a 13 años	IC 95%	
										Límite Inferior	Límite Superior
Buenos Aires	2,6	3,3	2,2	2,3	2,4	2,9	3,0	2,2	2,6	2,5	2,8
Catamarca	1,3	2,2	1,1	0,9	1,2	1,6	1,7	1,0	1,4	0,8	2,0
Córdoba	2,9	4,9	3,2	3,7	3,1	4,3	3,9	3,4	3,7	3,2	4,1
Corrientes	0,0	1,5	0,5	1,6	0,2	1,5	0,8	1,1	0,9	0,2	1,6
Entre Ríos	1,0	1,4	0,7	1,2	0,8	1,3	1,2	0,9	1,1	0,9	1,2
Formosa	1,3	1,0	0,5	1,1	0,8	1,1	1,1	0,8	0,9	0,7	1,2
Jujuy	4,1	5,1	3,4	3,7	3,7	4,4	4,6	3,5	4,1	3,7	4,4
La Pampa	4,0	4,6	2,8	2,9	3,4	3,8	4,3	2,8	3,6	3,1	4,0
La Rioja	6,8	7,1	6,4	6,5	6,7	6,9	7,0	6,4	6,8	6,3	7,3
Mendoza	4,2	5,3	3,2	4,4	3,7	4,9	4,7	3,8	4,3	3,7	4,9
Misiones	0,9	0,7	0,3	0,7	0,6	0,7	0,8	0,5	0,6	0,5	0,8
Neuquén	2,0	2,0	3,3	2,1	2,6	2,0	2,0	2,7	2,3	1,7	3,0
Salta	3,0	3,1	1,7	3,3	2,3	3,2	3,0	2,5	2,7	2,3	3,2
San Juan	3,6	4,3	2,9	4,3	3,3	4,3	4,0	3,6	3,8	3,4	4,2
San Luis	4,3	5,3	3,3	4,7	3,9	5,0	4,8	4,0	4,4	3,9	5,0
Santa Fe	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
S. Estero	1,6	2,3	1,8	1,8	1,7	2,1	1,9	1,8	1,9	1,5	2,2
Tucumán	0,3	1,0	0,0	0,4	0,2	0,7	0,6	0,2	0,4	0,1	1,0
T. Fuego	3,4	3,2	1,0	3,8	2,3	3,5	3,3	2,5	2,9	2,3	3,5
<b>Total País</b>	<b>2,7</b>	<b>3,2</b>	<b>2,1</b>	<b>2,6</b>	<b>2,4</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,3</b>	<b>2,7</b>	<b>2,6</b>	<b>2,7</b>

Fuente: PROSANE

Nota: en el anexo 2 se detallan las provincias excluidas del análisis

## HALLAZGOS RESPIRATORIOS

Tabla 15. Distribución porcentual de los niños/as y adolescentes con hallazgos respiratorios por provincia según sexo y grupos de edad. Año 2013

Provincia	Mujeres 5 a 9 años	Varones 5 a 9 años	Mujeres 10 a 13 años	Varones 10 a 13 años	Total Mujeres	Total Varones	Total 5 a 9 años	Total 10 a 13 años	Niñas/os de 5 a 13 años	IC 95%	
										Límite Inferior	Límite Superior
Buenos Aires	2,4	2,7	1,5	1,9	2,0	2,3	2,5	1,7	2,2	0,7	0,9
Catamarca	0,4	1,5	0,9	0,9	0,7	1,2	0,9	0,9	0,9	0,4	1,4
Córdoba	3,3	3,8	2,9	2,2	3,1	3,0	3,6	2,5	3,0	2,6	3,4
Corrientes	7,5	7,1	7,1	6,8	7,3	6,9	7,3	6,9	7,1	5,4	8,9
Entre Ríos	3,8	4,4	2,3	3,1	3,0	3,8	4,1	2,7	3,4	3,1	3,7
Formosa	3,1	3,9	1,4	2,0	2,3	3,0	3,5	1,7	2,6	2,3	3,0
Jujuy	4,4	4,8	3,1	3,1	3,7	3,9	4,6	3,1	3,8	3,5	4,2
La Pampa	5,2	5,2	1,9	3,0	3,6	4,1	5,2	2,5	3,8	3,4	4,3
La Rioja	1,1	1,7	0,5	1,2	0,9	1,5	1,4	0,8	1,2	1,0	1,4
Mendoza	7,9	6,1	5,9	6,2	7,0	6,1	7,0	6,1	6,6	3,9	7,3
Misiones	0,9	0,9	0,4	0,8	0,7	0,8	0,9	0,6	0,8	0,6	0,9
Neuquén	2,1	1,2	1,5	0,6	1,9	0,9	1,7	1,1	1,4	0,9	1,9
Salta	4,4	4,6	2,3	2,0	3,3	3,4	4,5	2,1	3,3	2,8	3,9
San Juan	2,4	3,2	1,5	1,7	2,0	2,5	2,8	1,6	2,3	1,9	2,6
San Luis	3,5	2,2	1,6	2,0	2,6	2,1	2,8	1,8	2,4	2,0	2,8
Santa Fe	0,4	0,3	0,1	0,1	0,3	0,2	0,4	0,1	0,3	0,2	0,4
S. Estero	3,5	4,4	2,0	1,9	2,8	3,3	4,0	2,0	3,0	2,5	3,5
Tucumán	3,7	4,1	1,1	3,5	2,5	3,9	3,9	2,2	3,2	2,1	4,2
T. Fuego	0,8	1,2	0,4	0,3	0,6	0,8	1,0	0,4	0,7	0,4	1,0
<b>Total País</b>	<b>2,7</b>	<b>3,0</b>	<b>1,7</b>	<b>2,1</b>	<b>2,3</b>	<b>2,6</b>	<b>2,8</b>	<b>1,9</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>

Fuente: PROSANE

Nota: en el anexo 2 se detallan las provincias excluidas del análisis

## HALLAZGOS DERMATOLÓGICOS

Tabla 16. Distribución porcentual de los niños/as y adolescentes con hallazgos dermatológicos por provincia según sexo y grupos de edad. Año 2013

Provincia	Mujeres 5 a 9 años	Varones 5 a 9 años	Mujeres 10 a 13 años	Varones 10 a 13 años	Total Mujeres	Total Varones	Total 5 a 9 años	Total 10 a 13 años	Niñas/os de 5 a 13 años	IC 95%	
										Límite Inferior	Límite Superior
Buenos Aires	2,8	2,8	2,4	2,6	2,6	2,7	2,8	2,5	2,7	2,5	2,8
Catamarca	2,4	3,4	3,3	3,7	2,9	3,6	2,9	3,5	3,2	2,3	4,0
Córdoba	3,4	4,5	3,8	4,1	3,6	4,3	4,0	4,0	4,0	3,5	4,4
Corrientes	2,5	2,2	4,3	3,6	3,3	2,8	2,4	4,0	3,1	1,9	4,2
Entre Ríos	1,9	1,9	1,6	1,8	1,7	1,9	1,9	1,7	1,8	1,6	2,0
Formosa	1,1	1,3	0,6	0,7	0,9	1,0	1,2	0,7	0,9	0,7	1,1
Jujuy	6,7	6,7	6,1	5,4	6,4	6,1	6,7	5,7	6,2	5,8	6,6
La Pampa	2,1	1,7	0,9	1,3	1,5	1,5	1,9	1,1	1,5	1,2	1,8
La Rioja	15,6	14,2	15,6	14,3	15,6	14,3	14,9	15,0	14,9	14,3	15,6
Mendoza	3,2	3,8	4,3	4,2	3,7	3,9	3,5	4,3	3,8	3,3	4,4
Misiones	1,1	1,2	0,5	0,8	0,8	1,0	1,1	0,7	0,9	0,7	1,1
Neuquén	1,2	1,1	2,4	0,8	1,8	0,9	1,1	1,6	1,4	0,9	1,8
Salta	5,8	6,2	5,9	7,1	5,9	6,6	6,0	6,4	6,2	5,5	6,9
San Juan	2,4	2,8	2,4	2,7	2,4	2,7	2,6	2,5	2,6	2,2	2,9
San Luis	1,5	1,9	0,9	2,2	1,2	2,0	1,7	1,5	1,6	1,3	1,9
Santa Fe	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
S. Estero	2,6	2,9	2,4	2,4	2,5	2,7	2,8	2,4	2,6	2,1	3,0
Tucumán	9,3	9,6	11,5	8,7	10,3	9,2	9,4	10,2	9,8	8,0	11,5
T. Fuego	5,7	5,5	4,4	3,4	5,0	4,5	5,6	3,9	4,8	4,0	5,5
<b>Total País</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,4</b>	<b>3,5</b>	<b>3,7</b>	<b>3,2</b>	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>	<b>3,6</b>

Fuente: PROSANE

Nota: en el anexo 2 se detallan las provincias excluidas del análisis

## HALLAZGOS GENITOURINARIOS EN VARONES

Tabla 17. Distribución porcentual de los niños y adolescentes con hallazgos genitourinarios por provincia según grupos de edad. Año 2013

Provincia	Varones 5 a 9 años	Varones 10 a 13 años	Total Varones	IC 95%	
				Límite Inferior	Límite Superior
Buenos Aires	4,3	3,4	3,9	3,7	4,2
Catamarca	0,5	2,0	1,2	0,4	2,0
Córdoba	2,7	3,2	2,9	2,4	3,5
Corrientes	1,5	0,0	0,9	0,2	2,2
Entre Ríos	0,4	0,4	0,4	0,2	0,5
Formosa	0,2	0,2	0,2	0,0	0,3
Jujuy	11,0	7,2	9,1	8,4	9,8
La Pampa	3,4	2,3	2,9	2,3	3,4
La Rioja	0,6	0,2	0,5	0,3	0,6
Mendoza	0,1	4,5	2,1	1,5	2,7
Misiones	0,2	0,1	0,1	0,0	0,2
Neuquén	4,1	6,7	5,3	3,9	6,6
Salta	4,9	1,4	3,3	2,5	4,0
San Juan	1,3	3,1	2,1	1,6	2,5
San Luis	4,1	2,4	3,4	2,7	4,1
Santa Fe	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
S. Estero	0,2	2,9	1,4	1,0	1,9
Tucumán	0,0	0,9	0,4	0,0	1,3
T. Fuego	9,9	3,6	6,8	5,6	8,0
<b>Total País</b>	<b>2,8</b>	<b>2,5</b>	<b>2,7</b>	<b>2,6</b>	<b>2,8</b>

Fuente: PROSANE

Nota: en el anexo 2 se detallan las provincias excluidas del análisis

## HALLAZGOS GENITOURINARIOS EN MUJERES

Tabla 18. Distribución porcentual de las niñas y adolescentes con hallazgos genitourinarios por provincia según grupos de edad. Año 2013

Provincia	Mujeres 5 a 9 años	Mujeres 10 a 13 años	Total Mujeres	IC 95%	
				Límite Inferior	Límite Superior
Buenos Aires	0,3	1,0	0,6	0,5	0,7
Catamarca	0,2	1,1	0,7	0,1	1,2
Córdoba	1,3	1,2	1,3	0,9	1,6
Corrientes	0,0	0,5	0,2	0,0	1,3
Entre Ríos	0,3	0,4	0,3	0,2	0,5
Formosa	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2
Jujuy	2,9	2,5	2,7	2,3	3,1
La Pampa	1,4	2,8	2,1	1,6	2,6
La Rioja	0,0	0,0	0,0	--	--
Mendoza	0,1	2,3	1,1	0,7	1,6
Misiones	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2
Neuquén	0,5	1,5	1,0	0,4	1,6
Salta	1,3	1,4	1,4	0,9	1,8
San Juan	0,4	1,8	1,0	0,7	1,3
San Luis	1,3	2,6	1,9	1,4	2,3
Santa Fe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
S. Estero	0,4	3,6	2,0	1,4	2,5
Tucumán	0,0	2,2	1,0	0,1	1,9
T. Fuego	1,4	0,3	0,8	0,4	1,3
<b>Total País</b>	<b>0,6</b>	<b>1,1</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>

Fuente: PROSANE

Nota: en el anexo 2 se detallan las provincias excluidas del análisis

## HALLAZGOS OSTEOARTICULARES

Tabla 19. Distribución porcentual de los niños/as y adolescentes con hallazgos Osteoarticulares por provincia según sexo y grupos de edad. Año 2013

Provincia	Mujeres 5 a 9 años	Varones 5 a 9 años	Mujeres 10 a 13 años	Varones 10 a 13 años	Total Mujeres	Total Varones	Total 5 a 9 años	Total 10 a 13 años	Niñas/os de 5 a 13 años	IC 95%	
										Límite Inferior	Límite Superior
Buenos Aires	8,8	10,4	11,3	10,9	10,0	10,6	9,6	11,1	10,3	10,0	10,6
Catamarca	15,6	15,0	12,7	16,3	14,1	15,6	15,3	14,2	14,8	13,1	16,5
Córdoba	8,0	5,8	6,7	5,6	7,4	5,7	6,9	6,2	6,5	5,9	7,1
Corrientes	0,8	0,0	1,1	0,5	0,9	0,2	0,4	0,8	0,6	0,2	1,3
Entre Ríos	7,3	8,4	8,2	6,6	7,8	7,5	7,8	7,4	7,6	7,2	8,0
Formosa	0,5	0,9	0,8	0,5	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,5	0,9
Jujuy	11,2	16,4	10,5	11,4	10,9	13,8	13,8	11,0	12,4	11,8	12,9
La Pampa	6,8	6,2	5,9	5,4	6,3	5,8	6,5	5,7	6,1	5,5	6,6
La Rioja	16,8	16,4	15,8	14,6	16,4	15,8	16,6	15,2	16,1	15,5	16,8
Mendoza	11,8	11,0	16,8	15,3	14,2	12,9	11,4	16,1	13,5	12,6	14,5
Misiones	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	0,2	0,4
Neuquén	13,7	12,4	18,8	14,5	16,1	13,3	13,0	16,8	14,8	13,3	16,2
Salta	3,5	4,2	5,6	4,1	4,6	4,2	3,9	4,9	4,4	3,8	5,0
San Juan	2,8	2,9	4,0	3,2	3,4	3,0	2,9	3,6	3,2	2,8	3,6
San Luis	5,0	6,5	5,7	4,7	5,3	5,7	5,7	5,2	5,5	4,9	6,1
Santa Fe	0,8	0,6	0,6	1,2	0,7	0,8	0,7	0,9	0,7	0,6	0,9
S. Estero	0,4	0,8	0,2	0,2	0,3	0,5	0,6	0,2	0,4	0,2	0,6
Tucumán	2,2	3,5	3,7	3,0	2,9	3,3	2,8	3,4	3,1	2,0	4,1
T. Fuego	18,7	20,8	13,7	16,6	16,3	18,7	19,7	15,2	17,6	16,3	18,9
<b>Total País</b>	<b>7,2</b>	<b>8,0</b>	<b>7,9</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,8</b>	<b>7,6</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,5</b>	<b>7,8</b>

Fuente: PROSANE

Nota: en el anexo 2 se detallan las provincias excluidas del análisis

## HALLAZGOS ABDOMINALES

Tabla 20. Distribución porcentual de los niños/as y adolescentes con hallazgos abdominales por provincia según sexo y grupos de edad. Año 2013

Provincia	Mujeres 5 a 9 años	Varones 5 a 9 años	Mujeres 10 a 13 años	Varones 10 a 13 años	Total Mujeres	Total Varones	Total 5 a 9 años	Total 10 a 13 años	Niñas/os de 5 a 13 años	IC 95%	
										Límite Inferior	Límite Superior
Buenos Aires	0,29	0,51	0,19	0,22	0,24	0,38	0,39	0,20	0,31	0,25	0,36
Catamarca	1,10	2,70	0,44	0,57	0,77	1,72	1,86	0,50	1,20	0,64	1,74
Córdoba	0,22	0,76	0,76	0,45	0,49	0,61	0,49	0,61	0,55	0,37	0,72
Corrientes	0,42	3,72	0,00	6,25	0,24	4,77	0,20	0,00	0,11	0,00	0,62
Entre Ríos	0,30	0,09	0,22	0,07	0,26	0,08	0,26	0,25	0,25	0,17	0,32
Formosa	0,19	0,58	0,05	0,99	0,12	0,79	0,19	0,10	0,14	0,05	0,23
Jujuy	0,45	0,18	0,65	0,12	0,55	0,15	0,40	0,61	0,51	0,38	0,63
La Pampa	1,07	1,28	0,21	0,11	0,64	0,72	0,69	0,22	0,46	0,30	0,62
La Rioja	0,65	0,10	0,47	0,20	0,59	0,14	0,63	0,29	0,51	0,38	0,64
Mendoza	0,46	0,54	0,18	0,19	0,33	0,38	0,38	0,27	0,33	0,15	0,50
Misiones	0,22	0,00	0,03	0,03	0,13	0,01	0,20	0,05	0,13	0,66	0,19
Neuquén	0,00	2,29	0,17	1,34	0,08	1,87	0,00	0,18	0,08	0,10	0,30
Salta	0,58	0,78	0,78	0,72	0,68	0,76	0,88	0,71	0,80	0,54	1,06
San Juan	0,44	0,08	0,15	0,06	0,30	0,07	0,43	0,28	0,36	0,23	0,49
San Luis	0,42	0,06	0,15	0,09	0,30	0,07	0,27	0,12	0,21	0,08	0,33
Santa Fe	0,05	0,29	0,06	0,58	0,05	0,38	0,04	0,06	0,05	0,02	0,10
S. Estero	0,57	0,07	0,44	0,25	0,51	0,15	0,67	0,59	0,63	0,41	0,85
Tucumán	0,00	0,96	1,48	1,30	0,67	1,10	0,16	1,40	0,70	0,17	1,23
T. Fuego	0,23	21,20	0,13	12,60	0,18	17,01	0,28	0,24	0,26	0,07	0,44
<b>Total País</b>	<b>0,36</b>	<b>0,41</b>	<b>0,28</b>	<b>0,29</b>	<b>0,32</b>	<b>0,36</b>	<b>0,39</b>	<b>0,28</b>	<b>0,34</b>	<b>0,31</b>	<b>0,36</b>

Fuente: PROSANE

Nota: en el anexo 2 se detallan las provincias excluidas del análisis

## HALLAZGOS NEUROLÓGICOS

Tabla 21. Distribución porcentual de los niños/as y adolescentes con hallazgos neurológicos por provincia según sexo y grupos de edad. Año 2013

Provincia	Mujeres 5 a 9 años	Varones 5 a 9 años	Mujeres 10 a 13 años	Varones 10 a 13 años	Total Mujeres	Total Varones	Total 5 a 9 años	Total 10 a 13 años	Niñas/os de 5 a 13 años	IC 95%	
										Límite Inferior	Límite Superior
Buenos Aires	0,91	1,53	0,99	1,51	0,95	1,52	1,21	1,23	1,22	1,11	1,32
Catamarca	0,00	0,74	0,44	0,86	0,22	0,79	0,35	0,62	0,48	0,11	0,84
Córdoba	0,88	0,76	0,38	0,45	0,63	0,61	0,82	0,41	0,62	0,43	0,80
Corrientes	1,26	1,86	0,00	0,00	0,71	1,08	1,57	0,00	0,90	0,22	1,58
Entre Ríos	0,57	0,77	0,76	1,16	0,67	0,97	0,67	0,96	0,82	0,68	0,95
Formosa	0,34	0,44	0,18	0,25	0,26	0,34	0,39	0,21	0,30	0,17	0,42
Jujuy	0,48	0,89	0,91	0,78	0,70	0,83	0,68	0,85	0,77	0,61	0,91
La Pampa	1,82	1,17	0,70	0,91	1,26	1,05	1,50	0,80	1,15	0,90	1,40
La Rioja	0,29	0,26	0,33	0,40	0,30	0,31	0,27	0,36	0,30	0,20	0,40
Mendoza	0,54	0,84	0,71	2,13	0,62	1,43	0,69	1,40	1,02	0,72	1,31
Misiones	0,11	0,27	0,03	0,16	0,07	0,22	0,19	0,09	0,14	0,07	0,21
Neuquén	0,16	0,92	0,00	0,19	0,08	0,59	0,55	0,09	0,34	0,08	0,59
Salta	1,07	1,10	0,16	0,45	0,60	0,80	1,08	0,29	0,70	0,45	0,94
San Juan	0,66	0,97	0,34	0,83	0,51	0,91	0,81	0,57	0,70	0,52	0,88
San Luis	0,78	0,87	0,96	1,56	0,86	1,16	0,82	1,24	1,00	0,73	1,26
Santa Fe	0,59	0,40	0,23	0,26	0,48	0,36	0,49	0,24	0,42	0,29	0,54
S. Estero	1,07	0,77	0,96	1,09	1,01	0,91	0,92	1,02	0,97	0,69	1,23
Tucumán	0,93	0,64	0,00	0,00	0,51	0,37	0,78	0,00	0,44	0,14	1,02
T. Fuego	0,23	0,76	0,13	0,11	0,18	0,45	0,50	0,12	0,32	0,11	0,52
<b>Total País</b>	<b>0,67</b>	<b>0,89</b>	<b>0,62</b>	<b>0,91</b>	<b>0,65</b>	<b>0,90</b>	<b>0,78</b>	<b>0,75</b>	<b>0,77</b>	<b>0,72</b>	<b>0,81</b>

Fuente: PROSANE

Nota: en el anexo 2 se detallan las provincias excluidas del análisis

## HALLAZGOS ANTROPOMÉTRICOS: SOBREPESO

Tabla 22. Distribución porcentual de los niños/as y adolescentes con sobrepeso por provincia según sexo y grupos de edad. Año 2013

Provincia	Mujeres 5 a 9 años	Varones 5 a 9 años	Mujeres 10 a 13 años	Varones 10 a 13 años	Total Mujeres	Total Varones	Total 5 a 9 años	Total 10 a 13 años	Niñas/os de 5 a 13 años	IC 95%	
										Límite Inferior	Límite Superior
Buenos Aires	21,5	21,2	26,2	24,6	23,7	22,7	21,3	25,5	23,2	22,9	23,6
Catamarca	18,9	18,4	26,4	18,9	22,7	18,6	18,7	23,1	20,8	18,9	22,8
Córdoba	18,4	17,8	22,6	23,0	20,5	20,3	18,1	22,8	20,4	19,5	21,4
Corrientes	19,7	18,6	25,0	27,1	22,0	22,1	19,1	26,1	22,1	19,3	24,8
Entre Ríos	18,9	19,3	24,6	22,8	21,8	21,0	19,1	23,7	21,4	20,8	22,0
Formosa	19,0	18,1	21,2	21,0	20,1	19,5	18,5	21,1	19,8	19,0	20,7
Jujuy	19,4	20,4	24,5	23,1	21,9	21,8	19,9	23,8	21,8	21,1	22,5
La Pampa	19,8	19,2	25,0	24,2	22,4	21,6	19,5	24,6	22,0	21,1	23,0
Mendoza	20,5	20,9	25,4	21,1	22,8	21,0	20,7	23,3	21,9	20,7	23,1
Misiones	16,5	17,9	20,9	18,7	18,6	18,2	17,2	19,8	18,4	17,8	19,1
Neuquén	22,2	23,1	25,5	27,2	23,8	24,9	22,7	26,3	24,3	22,6	26,1
Salta	19,6	17,3	24,4	23,5	22,1	20,2	18,4	24,0	21,2	20,0	22,3
San Juan	18,0	18,6	24,1	21,3	20,9	19,7	18,3	22,8	20,3	19,5	21,2
San Luis	15,7	18,1	21,5	19,3	18,3	18,6	16,9	20,5	18,4	17,4	19,4
Santa Fe	19,4	18,8	22,6	25,9	20,4	20,9	19,1	24,2	20,6	19,9	21,4
S. Estero	17,9	19,8	24,2	20,9	21,0	20,3	18,9	22,7	20,7	19,6	21,8
Tucumán	14,9	16,2	18,5	22,1	16,5	18,7	15,5	20,2	17,6	15,3	19,8
T. Fuego	23,2	22,5	31,8	26,8	27,2	24,6	22,8	29,1	25,9	24,4	27,3
<b>Total País</b>	<b>19,5</b>	<b>19,6</b>	<b>24,4</b>	<b>22,9</b>	<b>21,8</b>	<b>21,1</b>	<b>19,6</b>	<b>23,7</b>	<b>21,5</b>	<b>21,3</b>	<b>21,7</b>

Fuente: PROSANE

Nota: en el anexo 2 se detallan las provincias excluidas del análisis

## HALLAZGOS ANTROPOMÉTRICOS: OBESIDAD

Tabla 23. Distribución porcentual de los niños/as y adolescentes con obesidad por provincia según sexo y grupos de edad. Año 2013

Provincia	Mujeres 5 a 9 años	Varones 5 a 9 años	Mujeres 10 a 13 años	Varones 10 a 13 años	Total Mujeres	Total Varones	Total 5 a 9 años	Total 10 a 13 años	Niñas/os de 5 a 13 años	IC 95%	
										Límite Inferior	Límite Superior
Buenos Aires	15,6	18,6	16,6	22,6	16,0	20,4	17,0	19,4	18,1	17,7	18,5
Catamarca	16,7	15,9	15,5	25,1	16,1	20,2	16,4	19,7	18,0	16,1	19,8
Córdoba	13,4	15,2	12,0	17,4	12,7	16,3	14,3	14,7	14,5	13,7	15,3
Corrientes	10,0	14,1	12,5	15,6	11,1	14,8	12,2	14,1	13,0	10,7	15,3
Entre Ríos	14,0	16,5	10,7	16,8	12,3	16,6	15,3	13,7	14,5	14,0	15,0
Formosa	9,3	12,9	10,7	15,9	10,0	14,4	11,1	13,2	12,2	11,5	12,9
Jujuy	11,7	17,1	11,4	21,6	11,6	19,4	14,4	16,5	15,5	14,9	16,1
La Pampa	15,5	17,6	16,3	22,4	15,9	19,9	16,5	19,3	17,9	17,0	18,8
Mendoza	13,0	16,6	14,1	19,6	13,5	17,9	14,8	16,8	15,7	14,7	16,7
Misiones	8,5	12,2	8,4	12,6	8,4	12,4	10,4	10,5	10,4	9,9	10,9
Neuquén	15,1	21,3	16,7	28,3	15,9	24,4	18,3	22,2	20,1	18,5	21,8
Salta	12,8	17,5	11,9	19,7	12,3	18,5	15,2	15,5	15,4	14,3	16,4
San Juan	13,5	15,2	16,2	20,6	14,8	17,5	14,4	18,2	16,1	15,3	16,9
San Luis	11,4	14,1	12,4	15,4	11,8	14,6	12,7	13,8	13,2	12,3	14,0
Santa Fe	10,7	15,3	13,7	18,3	11,6	16,2	13,0	15,8	13,8	13,2	14,5
S. Estero	14,0	16,7	11,4	20,1	12,8	18,2	15,4	15,5	15,4	14,5	16,4
Tucumán	15,5	18,8	9,3	18,6	12,6	18,7	17,1	13,6	15,6	13,4	17,7
T. Fuego	18,7	23,3	18,2	30,5	18,4	26,8	21,0	24,7	22,8	21,3	24,2
<b>Total País</b>	<b>13,3</b>	<b>16,6</b>	<b>13,5</b>	<b>19,7</b>	<b>13,4</b>	<b>18,0</b>	<b>14,9</b>	<b>16,5</b>	<b>15,6</b>	<b>15,5</b>	<b>15,8</b>

Fuente: PROSANE

Nota: en el anexo 2 se detallan las provincias excluidas del análisis

## HALLAZGOS ANTROPOMÉTRICOS: SOBREPESO Y OBESIDAD

Tabla 24. Distribución porcentual de los niños/as y adolescentes con sobrepeso y obesidad por provincia según sexo y grupos de edad. Año 2013

Provincia	Mujeres 5 a 9 años	Varones 5 a 9 años	Mujeres 10 a 13 años	Varones 10 a 13 años	Total Mujeres	Total Varones	Total 5 a 9 años	Total 10 a 13 años	Niñas/os de 5 a 13 años	IC 95%	
										Límite Inferior	Límite Superior
Buenos Aires	37,0	39,9	42,8	47,2	39,7	43,1	38,4	44,9	41,3	40,8	41,8
Catamarca	35,7	34,3	41,9	44,0	38,8	38,8	35,0	42,8	38,8	36,4	41,2
Córdoba	31,8	33,0	34,7	40,4	33,3	36,6	32,4	37,5	34,9	33,8	36,0
Corrientes	29,7	32,7	37,5	42,7	33,1	36,9	31,3	40,2	35,1	31,9	38,3
Entre Ríos	32,8	35,8	35,3	39,5	34,1	37,6	34,3	37,4	35,9	35,2	36,6
Formosa	28,3	31,0	31,9	36,9	30,1	34,0	29,7	34,3	32,0	31,0	33,0
Jujuy	31,1	37,6	35,9	44,6	33,5	41,1	34,3	40,3	37,3	36,5	38,2
La Pampa	35,2	36,8	41,3	46,7	38,3	41,6	36,0	43,9	39,9	38,8	41,0
Mendoza	33,5	37,5	39,5	40,6	36,3	38,9	35,5	40,0	37,6	36,2	39,0
Misiones	24,9	30,1	29,3	31,3	27,0	30,7	27,6	30,3	28,8	28,1	29,6
Neuquén	37,3	44,3	42,2	55,4	39,7	49,3	41,0	48,5	44,5	42,4	46,5
Salta	32,4	34,9	36,3	43,2	34,4	38,7	33,6	39,5	36,5	35,2	37,9
San Juan	31,5	33,8	40,3	41,8	35,7	37,2	32,7	41,0	36,5	35,4	37,5
San Luis	27,1	32,2	33,9	34,6	30,1	33,2	29,6	34,2	31,6	30,4	32,8
Santa Fe	30,1	34,1	36,2	44,2	32,0	37,1	32,1	40,0	34,4	33,5	35,3
S. Estero	31,9	36,5	35,6	41,0	33,7	38,6	34,3	38,1	36,1	34,8	37,4
Tucumán	30,3	35,0	27,8	40,7	29,2	37,4	32,7	33,7	33,1	30,4	35,9
T. Fuego	41,9	45,8	49,9	57,3	45,6	51,4	43,8	53,8	48,6	46,9	50,3
<b>Total País</b>	<b>32,8</b>	<b>36,2</b>	<b>37,8</b>	<b>42,6</b>	<b>35,2</b>	<b>39,1</b>	<b>34,5</b>	<b>40,1</b>	<b>37,1</b>	<b>36,8</b>	<b>37,3</b>

Fuente: PROSANE

Nota: en el anexo 2 se detallan las provincias excluidas del análisis

## HALLAZGOS ANTROPOMÉTRICOS: EMACIACIÓN

Tabla 25. Distribución porcentual de los niños/as y adolescentes con emaciación por provincia según sexo y grupos de edad. Año 2013

Provincia	Mujeres 5 a 9 años	Varones 5 a 9 años	Mujeres 10 a 13 años	Varones 10 a 13 años	Total Mujeres	Total Varones	Total 5 a 9 años	Total 10 a 13 años	Niñas/os de 5 a 13 años	IC 95%	
										Límite Inferior	Límite Superior
Buenos Aires	2,0	1,9	2,1	1,7	2,1	1,8	2,0	1,9	1,9	1,8	2,1
Catamarca	1,3	1,5	3,7	3,4	2,5	2,4	1,4	3,6	2,5	1,7	3,2
Córdoba	2,4	3,3	3,2	3,5	2,8	3,4	2,8	3,4	3,1	2,7	3,5
Corrientes	2,1	0,7	2,2	1,6	2,1	1,1	1,4	1,9	1,6	0,7	2,5
Entre Ríos	1,6	1,4	3,0	2,4	2,3	1,9	1,5	2,7	2,1	1,9	2,3
Formosa	4,5	3,6	2,4	2,5	3,4	3,1	4,1	2,5	3,3	2,9	3,6
Jujuy	1,1	0,7	1,9	1,2	1,5	1,0	0,9	1,6	1,2	1,1	1,4
La Pampa	0,9	1,1	2,0	1,8	1,5	1,4	1,0	1,9	1,5	1,2	1,7
Mendoza	1,2	1,3	2,0	2,0	1,6	1,6	1,2	2,0	1,6	1,2	2,0
Misiones	1,2	1,6	2,4	2,4	1,8	2,0	1,4	2,4	1,9	1,7	2,1
Neuquén	1,6	2,1	2,1	1,5	1,9	1,9	1,9	1,8	1,9	1,3	2,4
Salta	2,6	2,4	3,1	2,4	2,8	2,4	2,5	2,8	2,6	2,2	3,1
San Juan	2,3	2,1	2,3	2,2	2,3	2,1	2,2	2,3	2,2	1,9	2,5
San Luis	1,6	1,8	2,7	2,4	2,1	2,1	1,7	2,6	2,1	1,7	2,5
Santa Fe	1,2	2,0	1,8	2,6	1,3	2,2	1,6	2,2	1,8	1,5	2,0
S. Estero	1,9	2,7	4,3	3,1	3,0	2,9	2,3	3,7	3,0	2,5	3,4
Tucumán	1,5	2,9	3,0	0,9	2,2	2,0	2,2	2,0	2,1	1,2	3,0
T. Fuego	1,4	1,4	1,4	1,0	1,4	1,2	1,4	1,2	1,3	0,9	1,7
<b>Total País</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>2,4</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>2,3</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>

Fuente: PROSANE

Nota: en el anexo 2 se detallan las provincias excluidas del análisis

## HALLAZGOS ANTROPOMÉTRICOS: BAJA TALLA

Tabla 26. Distribución porcentual de los niños/as y adolescentes con baja talla por provincia según sexo y grupos de edad. Año 2013

Provincia	Mujeres 5 a 9 años	Varones 5 a 9 años	Mujeres 10 a 13 años	Varones 10 a 13 años	Total Mujeres	Total Varones	Total 5 a 9 años	Total 10 a 13 años	Niñas/os de 5 a 13 años	IC 95%	
										Límite Inferior	Límite Superior
Buenos Aires	2,4	3,9	2,4	1,9	2,4	3,0	3,2	2,1	2,7	2,5	2,9
Catamarca	0,4	1,2	1,1	1,7	0,8	1,5	0,8	1,4	1,1	0,6	1,6
Córdoba	1,3	2,2	2,5	2,4	1,9	2,3	1,7	2,5	2,1	1,8	2,4
Corrientes	5,0	4,5	3,8	4,7	4,5	4,6	4,7	4,3	4,5	3,1	6,0
Entre Ríos	1,9	3,1	2,1	1,9	2,0	2,5	2,5	2,0	2,2	2,0	2,5
Formosa	7,3	9,1	2,0	1,4	4,6	5,3	8,2	1,7	4,9	4,5	5,4
Jujuy	1,5	1,7	1,7	1,3	1,6	1,5	1,6	1,5	1,6	1,3	1,8
La Pampa	1,6	2,1	1,1	0,9	1,3	1,5	1,8	1,0	1,4	1,1	1,7
Mendoza	1,0	1,0	1,7	1,0	1,3	1,0	1,0	1,4	1,2	0,9	1,5
Misiones	3,9	6,0	3,7	3,0	3,8	4,6	5,0	3,3	4,2	3,9	4,5
Neuquén	0,7	1,1	0,9	0,2	0,8	0,7	0,9	0,5	0,7	0,4	1,1
Salta	0,8	2,0	1,7	1,7	1,3	1,9	1,4	1,7	1,6	1,2	1,9
San Juan	0,7	1,4	1,6	1,4	1,1	1,4	1,0	1,5	1,2	1,0	1,5
San Luis	1,6	2,9	2,2	2,0	1,9	2,5	2,2	2,1	2,2	1,8	2,6
Santa Fe	3,3	9,0	3,2	1,9	3,3	7,0	6,1	2,6	5,1	4,7	5,5
S. Estero	3,1	3,9	2,2	1,3	2,7	2,7	3,5	1,8	2,7	2,3	3,1
Tucumán	1,5	2,2	1,1	2,6	1,3	2,4	1,9	1,8	1,8	1,0	2,7
T. Fuego	1,5	0,5	0,9	0,9	1,2	0,7	1,0	0,9	1,0	0,6	1,3
<b>Total País</b>	<b>2,4</b>	<b>3,9</b>	<b>2,2</b>	<b>1,8</b>	<b>2,3</b>	<b>2,9</b>	<b>3,2</b>	<b>2,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>	<b>2,7</b>

Fuente: PROSANE

Nota: en el anexo 2 se detallan las provincias excluidas del análisis

## HALLAZGOS OFTALMOLÓGICOS: DISMINUCIÓN DE LA AGUDEZA VISUAL

Tabla 27. Distribución porcentual de los niños/as y adolescentes con disminución de la agudeza visual por provincia según sexo y grupos de edad. Año 2013

Provincia	Mujeres 5 a 9 años	Varones 5 a 9 años	Mujeres 10 a 13 años	Varones 10 a 13 años	Total Mujeres	Total Varones	Total 5 a 9 años	Total 10 a 13 años	Niñas/os de 5 a 13 años	IC 95%	
										Límite Inferior	Límite Superior
Buenos Aires	10,7	9,2	8,3	7,8	9,6	8,6	10,0	8,0	9,1	8,8	9,4
Catamarca	19,4	19,1	13,8	17,4	16,6	18,3	19,3	15,3	17,4	15,5	19,2
Córdoba	13,9	13,2	10,3	9,3	12,1	11,3	13,6	9,8	11,7	11,0	12,4
Corrientes	3,3	4,1	2,7	5,2	3,1	4,6	3,7	4,0	3,8	2,5	5,2
Entre Ríos	5,0	4,4	3,5	3,1	4,3	3,8	4,7	3,3	4,0	3,7	4,3
Formosa	1,4	1,6	2,4	1,8	1,9	1,7	1,5	2,1	1,8	1,5	2,1
Jujuy	27,9	25,5	21,0	17,2	24,4	21,3	26,7	19,1	22,9	22,1	23,6
La Pampa	2,5	3,1	2,2	1,8	2,3	2,5	2,8	2,0	2,4	2,0	2,7
La Rioja	9,2	8,6	7,9	8,6	8,8	8,6	8,9	8,3	8,7	8,2	9,2
Mendoza	27,5	25,1	17,2	14,0	22,7	20,1	26,3	15,6	21,4	20,2	22,6
Neuquén	20,1	17,6	16,4	12,6	18,3	15,4	18,8	14,6	16,8	15,3	18,4
Salta	16,4	15,5	12,7	12,8	14,5	14,3	16,0	12,8	14,4	17,4	15,4
San Juan	10,2	9,8	9,5	5,6	9,9	8,0	10,0	7,7	8,9	8,3	9,5
San Luis	12,1	11,5	11,7	7,8	11,9	10,0	11,8	9,9	11,0	10,2	11,8
Santa Fe	3,6	3,1	2,1	2,4	3,1	2,9	3,3	2,2	3,0	2,7	3,3
S. Estero	18,2	19,6	14,7	11,3	16,5	15,8	18,9	13,1	16,2	15,2	17,1
Tucumán	22,6	21,0	14,4	12,1	18,9	17,2	21,8	13,4	18,1	15,8	20,4
<b>Total País</b>	<b>11,2</b>	<b>10,3</b>	<b>9,1</b>	<b>7,9</b>	<b>10,2</b>	<b>9,3</b>	<b>10,8</b>	<b>8,5</b>	<b>9,8</b>	<b>9,6</b>	<b>9,9</b>

Fuente: PROSANE

Nota: en el anexo 2 se detallan las provincias excluidas del análisis

## HALLAZGOS OFTALMOLÓGICOS: ESTRABISMO

Tabla 28. Distribución porcentual de los niños/as y adolescentes con estrabismo por provincia según sexo y grupos de edad. Año 2013

Provincia	Mujeres 5 a 9 años	Varones 5 a 9 años	Mujeres 10 a 13 años	Varones 10 a 13 años	Total Mujeres	Total Varones	Total 5 a 9 años	Total 10 a 13 años	Niñas/os de 5 a 13 años	IC 95%	
										Límite Inferior	Límite Superior
Buenos Aires	1,38	1,03	1,03	0,93	1,22	0,99	1,21	0,99	1,11	1,01	1,20
Catamarca	0,88	0,49	0,22	0,86	0,55	0,66	0,70	0,50	0,60	0,19	0,99
Córdoba	2,27	2,65	1,30	2,19	1,78	2,43	2,46	1,74	2,10	1,76	2,43
Corrientes	3,35	2,60	2,72	1,56	3,07	2,17	2,95	2,13	2,60	1,49	3,70
Entre Ríos	0,27	0,31	0,40	0,16	0,34	0,23	0,29	0,28	0,29	0,20	0,36
Formosa	0,87	0,92	0,92	0,59	0,90	0,76	0,90	0,76	0,83	0,62	1,03
La Pampa	0,54	0,27	0,75	0,46	0,64	0,36	0,40	0,61	0,50	0,33	0,67
La Rioja	0,23	0,21	0,23	0,40	0,23	0,27	0,22	0,31	0,25	0,15	0,34
Mendoza	2,77	2,76	1,42	1,58	2,14	2,23	2,76	1,49	2,18	1,75	2,60
Misiones	1,84	1,82	2,51	1,76	2,16	1,79	1,83	2,14	1,97	1,73	2,21
Salta	2,63	2,83	1,41	2,17	2,00	2,52	2,73	1,76	2,26	1,83	2,68
San Juan	0,79	0,88	0,49	0,50	0,65	0,72	0,84	0,49	0,68	0,50	0,86
San Luis	1,79	1,75	1,26	1,13	1,55	1,49	1,77	1,20	1,52	1,19	1,84
Santa Fe	0,43	0,29	0,46	0,71	0,44	0,41	0,36	0,58	0,43	0,30	0,55
S. Estero	2,00	1,54	1,18	0,84	1,59	1,22	1,76	1,02	1,41	1,08	1,73
Tucumán	1,55	1,59	0,74	1,30	1,18	1,47	1,57	1,00	1,32	0,61	2,02
<b>Total País</b>	<b>1,18</b>	<b>1,07</b>	<b>1,01</b>	<b>0,93</b>	<b>1,10</b>	<b>1,01</b>	<b>1,13</b>	<b>0,97</b>	<b>1,06</b>	<b>1,01</b>	<b>1,11</b>

Fuente: PROSANE

Nota: en el anexo 2 se detallan las provincias excluidas del análisis

## HALLAZGOS FONOAUDIOLÓGICOS: TRASTORNOS DE LA FONACIÓN

Tabla 29. Distribución porcentual de los niños/as y adolescentes con trastornos de la fonación por provincia según sexo y grupos de edad. Año 2013

Provincia	Mujeres 5 a 9 años	Varones 5 a 9 años	Mujeres 10 a 13 años	Varones 10 a 13 años	Total Mujeres	Total Varones	Total 5 a 9 años	Total 10 a 13 años	Niñas/os de 5 a 13 años	IC 95%	
										Límite Inferior	Límite Superior
Buenos Aires	8,3	10,8	1,5	2,2	5,1	7,0	9,5	1,8	6,0	5,8	6,3
Catamarca	6,4	5,1	2,2	7,1	4,3	6,1	5,8	4,3	5,1	4,0	6,2
Córdoba	4,3	7,1	1,2	1,2	2,7	4,2	5,7	1,2	3,5	3,0	3,9
Corrientes	3,8	4,5	0,5	0,0	2,4	2,6	4,1	0,3	2,5	1,4	3,6
Entre Ríos	1,0	1,9	0,2	0,2	0,6	1,0	1,5	0,2	0,8	0,7	1,0
La Pampa	1,1	2,0	0,3	0,2	0,7	1,2	1,6	0,2	0,9	0,7	1,1
La Rioja	0,5	1,1	0,7	0,7	0,6	1,0	0,8	0,7	0,8	0,6	0,9
Mendoza	0,9	2,9	0,7	1,1	0,8	2,1	1,9	0,9	1,5	1,1	1,8
Misiones	3,3	6,5	1,1	1,6	2,2	4,3	4,9	1,3	3,3	3,0	3,6
Neuquén	2,8	6,7	0,7	0,2	1,8	3,8	4,8	0,5	2,8	2,1	3,5
Salta	6,0	7,0	1,8	1,4	3,8	4,4	6,5	1,6	4,1	3,5	4,7
San Juan	4,3	6,6	1,8	1,4	3,1	4,4	5,5	1,6	3,7	3,2	4,1
San Luis	4,2	7,8	1,4	1,6	2,9	5,2	6,0	1,5	4,0	3,5	4,5
Santa Fe	6,6	3,9	0,7	0,6	4,8	2,9	5,3	0,6	3,9	3,5	4,2
Tucumán	17,6	23,9	1,9	6,5	10,5	16,5	20,7	4,0	13,4	11,3	15,4
<b>Total País</b>	<b>4,8</b>	<b>6,4</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>	<b>3,1</b>	<b>4,2</b>	<b>5,6</b>	<b>1,2</b>	<b>3,7</b>	<b>3,6</b>	<b>3,8</b>

Fuente: PROSANE

Nota: en el anexo 2 se detallan las provincias excluidas del análisis

## HALLAZGOS FONOAUDIOLÓGICOS: HIPOACUSIA

Tabla 30. Distribución porcentual de los niños/as y adolescentes con hipoacusia por provincia según sexo y grupos de edad. Año 2013

Provincia	Mujeres 5 a 9 años	Varones 5 a 9 años	Mujeres 10 a 13 años	Varones 10 a 13 años	Total Mujeres	Total Varones	Total 5 a 9 años	Total 10 a 13 años	Niñas/os de 5 a 13 años	IC 95%	
										Límite Inferior	Límite Superior
Buenos Aires	1,40	1,46	1,64	1,15	1,51	1,32	1,43	1,41	1,42	1,30	1,53
Catamarca	1,76	2,70	2,84	2,57	2,30	2,64	2,20	2,72	2,46	1,68	3,23
Córdoba	0,66	0,87	0,11	0,34	0,38	0,61	0,77	0,22	0,49	0,32	0,66
Corrientes	0,84	0,37	0,00	0,00	0,47	0,22	0,59	0,00	0,34	0,07	0,98
Entre Ríos	0,25	0,18	0,20	0,13	0,23	0,16	0,21	0,17	0,19	0,12	0,25
Jujuy	1,52	2,34	1,06	1,15	1,29	1,74	1,93	1,11	1,52	1,30	1,72
La Pampa	0,48	0,64	0,00	0,23	0,24	0,44	0,56	0,11	0,34	0,20	0,47
La Rioja	0,34	0,21	0,42	0,45	0,37	0,29	0,27	0,43	0,33	0,22	0,43
Mendoza	0,77	0,92	0,53	0,56	0,66	0,76	0,84	0,54	0,71	0,46	0,95
Misiones	0,99	0,72	1,45	1,50	1,21	1,08	0,85	1,47	1,14	0,96	1,32
Neuquén	0,33	0,76	0,34	0,19	0,34	0,51	0,55	0,27	0,42	0,14	0,70
Salta	1,48	1,18	2,35	1,99	1,92	1,55	1,32	2,18	1,74	1,36	2,12
San Juan	0,35	0,50	0,58	0,55	0,46	0,53	0,43	0,57	0,49	0,33	0,64
San Luis	2,81	3,87	3,19	2,60	2,98	3,34	3,33	2,92	3,15	2,69	3,60
Santa Fe	0,31	0,56	0,17	0,06	0,27	0,41	0,43	0,12	0,34	0,22	0,45
Tucumán	0,31	0,32	0,37	0,00	0,34	0,18	0,31	0,20	0,26	0,01	0,76
<b>Total País</b>	<b>0,96</b>	<b>1,07</b>	<b>1,06</b>	<b>0,88</b>	<b>1,00</b>	<b>0,99</b>	<b>1,01</b>	<b>0,97</b>	<b>1,00</b>	<b>0,95</b>	<b>1,05</b>

Fuente: PROSANE

Nota: en el anexo 2 se detallan las provincias excluidas del análisis

## REALIZACIÓN DE AUDIOMETRÍAS:

Tabla 31. Distribución porcentual de los niños/as y adolescentes según evaluación con audiometría y detección de hipoacusia por Provincias de Argentina. Año 2013

Provincias	N° de niños/as evaluados	N° de audiometrías realizadas	% niños/as evaluados con audiometría	N° niños/as con detección de hipoacusia por audiometría	% niños/as detectados con hipoacusia a quienes se realizó audiometría
Buenos Aires	44.311	4.896	11,0	198	4,0
Catamarca	1.670	4	0,2	1	25,0
Córdoba	7.284	57	0,8	1	1,8
Corrientes	884	1	0,1	0	0,0
Entre Ríos	17.871	782	4,4	4	0,5
Formosa	8.318	384	4,6	1	0,3
Jujuy	13.587	4.539	33,4	107	2,4
La Pampa	7.363	46	0,6	9	19,6
Misiones	13.823	10.837	78,4	148	1,4
Neuquén	2.366	3	0,1	0	0,0
Salta	4.874	171	3,5	0	0,0
San Juan	8.529	505	5,9	4	0,8
San Luis	5.780	415	7,2	26	6,3
Santa Fe	10.972	1.329	12,1	8	0,6
S. Estero	5.386	496	9,2	49	9,9
<b>Total País</b>	<b>153.018</b>	<b>24.465</b>	<b>16,0</b>	<b>556</b>	<b>2,3</b>

Fuente: PROSANE

Nota: Se excluyeron las provincias de Mendoza, La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego ya que no incluyeron datos de la realización de audiometrías.

## HALLAZGOS ODONTOLÓGICOS: PATOLOGÍA DE PIEZAS TEMPORARIAS

Tabla 32. Distribución porcentual de los niños/as y adolescentes con patología de piezas temporarias por provincia según sexo y grupos de edad. Año 2013

Provincia	Mujeres 5 a 9 años	Varones 5 a 9 años	Mujeres 10 a 13 años	Varones 10 a 13 años	Total Mujeres	Total Varones	Total 5 a 9 años	Total 10 a 13 años	Niñas/os de 5 a 13 años	IC 95%	
										Límite Inferior	Límite Superior
Catamarca	58,1	63,5	27,5	28,6	42,8	47,4	60,7	28,0	44,9	42,4	47,3
Córdoba	63,7	64,9	27,2	30,6	45,3	48,1	64,3	28,9	46,7	45,5	47,8
Corrientes	79,5	76,2	17,9	16,1	52,7	51,2	77,8	17,0	51,9	48,6	55,3
Formosa	24,6	24,9	13,5	15,1	18,9	20,1	24,8	14,3	19,5	18,6	20,3
La Pampa	44,5	43,7	21,0	24,1	32,7	34,2	44,1	22,5	33,5	32,4	34,5
Mendoza	63,4	60,6	16,6	17,8	41,7	41,2	62,0	17,2	41,5	40,1	42,9
Misiones	64,8	68,6	24,0	28,1	45,4	50,2	66,7	26,0	47,7	46,9	48,6
Salta	82,0	79,8	18,8	21,2	49,6	52,6	80,9	19,9	51,1	49,7	52,5
San Juan	66,0	66,6	21,1	26,0	44,7	49,0	66,3	23,4	46,8	45,8	47,9
S. Estero	23,7	24,7	10,5	11,1	17,2	18,5	24,2	10,8	17,9	16,8	18,9
Tucumán	66,9	69,4	11,5	20,8	41,7	48,8	68,1	15,8	45,1	42,1	48,0
<b>Total País</b>	<b>55,3</b>	<b>56,4</b>	<b>19,9</b>	<b>23,0</b>	<b>38,0</b>	<b>40,9</b>	<b>55,8</b>	<b>21,4</b>	<b>39,4</b>	<b>39,0</b>	<b>39,8</b>

Fuente: PROSANE

Nota: en el anexo 2 se detallan las provincias excluidas del análisis

## HALLAZGOS ODONTOLÓGICOS: PATOLOGÍA DE PIEZAS DEFINITIVAS

Tabla 33. Distribución porcentual de los niños/as y adolescentes con patología de piezas definitivas por provincia según sexo y grupos de edad. Año 2013

Provincia	Mujeres 5 a 9 años	Varones 5 a 9 años	Mujeres 10 a 13 años	Varones 10 a 13 años	Total Mujeres	Total Varones	Total 5 a 9 años	Total 10 a 13 años	Niñas/os de 5 a 13 años	IC 95%	
										Límite Inferior	Límite Superior
Catamarca	7,3	8,1	53,7	53,4	30,6	29,0	7,7	53,6	29,9	27,7	32,1
Córdoba	13,6	11,9	63,3	59,5	38,7	35,2	12,7	61,4	37,0	35,9	38,1
Corrientes	20,1	15,6	69,6	68,8	41,6	37,7	17,7	69,1	39,6	36,3	42,9
Formosa	8,3	7,3	24,0	23,4	16,3	15,3	7,8	23,7	15,8	15,0	16,6
La Pampa	4,2	3,9	34,7	33,9	19,4	18,4	4,0	34,3	18,9	18,0	19,8
La Rioja	24,7	24,7	38,1	37,6	29,5	29,1	24,7	37,9	29,3	28,5	30,1
Mendoza	12,6	9,3	51,9	47,4	30,9	26,5	10,9	49,7	28,7	27,4	30,0
Misiones	19,6	18,5	58,9	53,2	38,3	34,3	19,0	56,2	36,3	35,5	37,1
Salta	23,2	18,5	75,3	73,4	49,8	44,0	20,8	74,4	47,0	45,6	48,4
San Juan	12,4	11,6	60,4	54,8	35,2	30,3	12,0	57,8	32,8	31,8	33,8
S. Estero	7,4	6,8	24,4	19,4	15,8	12,6	7,1	22,1	14,2	13,3	15,1
Tucumán	8,4	5,7	66,3	52,8	34,7	25,7	7,1	60,1	30,4	27,7	33,1
<b>Total País</b>	<b>15,2</b>	<b>14,0</b>	<b>48,6</b>	<b>45,3</b>	<b>30,8</b>	<b>27,9</b>	<b>14,6</b>	<b>47,0</b>	<b>29,4</b>	<b>29,1</b>	<b>29,7</b>

Fuente: PROSANE

Nota: en el anexo 2 se detallan las provincias excluidas del análisis

## HALLAZGOS ODONTOLÓGICOS: MALOCCLUSIÓN

Tabla 34. Distribución porcentual de los niños/as y adolescentes con maloclusión por provincia según sexo y grupos de edad. Año 2013

Provincia	Mujeres 5 a 9 años	Varones 5 a 9 años	Mujeres 10 a 13 años	Varones 10 a 13 años	Total Mujeres	Total Varones	Total 5 a 9 años	Total 10 a 13 años	Niñas/os de 5 a 13 años	IC 95%	
										Límite Inferior	Límite Superior
Buenos Aires	10,6	9,5	20,0	20,4	15,0	14,3	10,1	20,2	14,7	14,3	15,0
Catamarca	16,3	12,5	33,4	30,0	24,9	20,6	14,5	31,9	22,9	20,9	25,0
Córdoba	27,4	24,5	43,7	41,4	35,7	32,8	25,9	42,6	34,2	33,1	35,3
Corrientes	66,9	66,2	69,0	75,0	67,8	69,8	66,5	72,1	68,9	27,6	33,8
Entre Ríos	11,9	10,5	17,9	16,2	14,9	13,4	11,2	17,1	14,1	13,6	14,6
Formosa	10,7	10,9	24,7	27,6	17,9	19,2	10,8	26,1	18,5	17,7	19,3
La Pampa	6,7	6,1	13,0	12,6	9,9	9,2	6,4	12,8	9,5	8,9	10,2
La Rioja	22,3	23,4	26,0	25,8	23,6	24,2	22,8	25,9	23,9	23,1	24,7
Mendoza	12,0	11,1	25,6	24,6	18,3	17,2	11,5	25,1	17,7	16,7	18,8
Misiones	8,6	9,1	9,5	10,7	9,0	9,8	8,8	10,1	9,4	8,9	9,9
Neuquén	34,4	33,2	53,0	53,5	43,5	42,2	33,8	53,3	42,9	40,8	44,9
Salta	30,2	28,6	39,4	39,8	34,9	33,8	29,4	39,6	34,4	33,0	35,7
San Juan	9,0	8,9	15,4	15,0	12,0	11,6	9,0	15,2	11,8	11,1	12,5
San Luis	16,5	15,5	24,8	24,5	20,2	19,3	16,0	24,7	19,8	18,7	20,8
S. Estero	12,5	13,8	20,7	22,2	16,5	17,6	13,2	21,4	17,1	16,0	18,1
Tucumán	40,6	40,1	50,7	44,2	45,2	41,8	40,3	47,7	43,6	40,7	46,5
<b>Total País</b>	<b>14,2</b>	<b>13,7</b>	<b>22,3</b>	<b>22,3</b>	<b>18,0</b>	<b>17,5</b>	<b>13,9</b>	<b>22,3</b>	<b>17,8</b>	<b>17,6</b>	<b>18,0</b>

Fuente: PROSANE

Nota: en el anexo 2 se detallan las provincias excluidas del análisis

### (Footnotes)

1 CIE-10: Clasificación Internacional de Enfermedades Décima Revisión













